衛生家寶產科備要

二



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



衞生家寶產科備要

(二)

朱端章編

衞生家寶產科備要卷第四

產育保慶集方。余收產論二十一篇。議論精確。無所不究。蓋國醫博極方書所得之妙。稽乎有其說而無其方。郭君稽中爲時良醫。尤長於治產。故其切脈用藥屢取奇功。一日願以所收家方。附於諸論之末。遂編爲一集。眞濟衆之異書也。古人謂爲人子而不學醫者爲不孝。則有方論而不傳於世者。其可謂之仁哉。大觀三年九月五日濮陽李師聖述。

二十一論。幷增入十八論。

李師聖編論。郭稽中附方。

第一論曰熱疾胎死腹中者何。

答曰。因母患熱疾。至六七日以後。臟腑熱極。薰蒸其胎。是以致死。緣兒死身冷。不能自出。但服黑神散煖其胎。須臾胎氣温煖。卽自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者是其驗。黑神散方。貳

◉黑神散

桂去麤皮。不見火。剉碎。 當歸洗去蘆須。切、焙。 芎藥洗、剉。 甘草炙、剉。 生乾地黃溫湯洗淨。剉、焙。忌冷水。 乾薑宜用炒生薑代之。各一兩。 附子半兩炮去皮臍。 雄黑豆二兩。小者是。炒焦去皮。

右爲末。每服一錢匕。空心温酒調下。

◉蒲黃黑神散　此方十八論云．產前產後一切疾．皆治之．

雄黑豆二兩．小者是．炒去皮．秤．　當歸洗去蘆并須．　芎藭洗、劉．　甘草炙、劉．　乾薑炮、劉．　肉桂去皮．劉．不見火．　生乾地黃溫湯洗．劉、焙．忌冷水．　蒲黃銀石器內微炒令赤．或以紙襯銚子內．炒紙黃爲度．　各一兩．

右爲末．每服二錢．空心温酒調下．若三十已下及生產少婦人．不用桂、乾薑．入炒生薑、紅花代之．生薑、紅花各用二兩．經洗者．並焙乾．

第二論曰．胎衣不下者何．

答曰．母生子訖．血流入衣中．衣爲血所脹．是故不得下．治之稍緩．脹滿腹中．漸次上衝．心胷疼痛．喘急者難治．但服奪命丹．以速去衣中之血．血散脹消．胎衣自下而無所患．

◉奪命丹

附子半兩．炮去皮臍．切．　牡丹皮一兩．洗、劉．　乾漆一分．搗碎．炒．煙盡．

右爲末．醋一升大黃末一兩．同熬成膏．和藥如桐子大．温酒下五七圓．不以時候．

又十論云．但服蒲黃黑神散．逐去衣中血．卽胎下．或帶斷亦同．

第三論曰．難產者何．

答曰．胎側有成形塊．呼爲兒枕．子欲生時．枕破．與敗血裹其子．故難產．但服勝金散．逐其敗血．卽自生成．若逆生、橫生．並皆主之．

◉勝金散

麝香一錢。先研爲細末。　鹽豉一兩。用舊青布裹了。燒令通紅。急以乳鉢研爲末。

右爲末。取秤鎚燒紅。以酒淬之。調下藥一錢匕。

又十八論云。但服蒲黃黑神散。解其敗血。卽自生也。或橫生、逆生。胎衣不下。此藥悉治。

第四論曰。產後血運者何。

答曰。產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕不知人。口噤、神昏、氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服淸魂散自瘥。

◉淸魂散

澤蘭葉揀淨。　人參去蘆。各一分。　荊芥穗一兩。曬。　芎半兩。洗、剉。　甘草二錢。炙、剉。

右爲細末。每服一錢匕。熱湯溫酒各小半盞調勻。急灌之。下咽喉卽開眼、氣定。省人事。

又十八論云。但服蒲黃黑神散自瘥。

第五論曰。產後口乾痞悶者何。

答曰。產後宮胃大虛。血氣未定。食麵太早。胃不能消化。麵毒結聚於胃脘。上薰胷中。是以口乾、煩渴。心下痞悶。醫者不識。認爲胷膈壅滯。以藥下之。萬不得一。但服見睨圓自瘥。

◉見睨圓

薑黃片子者。剉。荊三稜煨。乘熱鎚碎。焙乾用。蓬莪茂煨。乘熱鎚剉。焙乾用。華澄茄不得用火炒。陳皮去白。高良薑剉碎。炒。人參去蘆。切片。

右七味等分爲末。用細切蘿蔔慢火煮令爛。研細。將汁煮糊。圓梧桐子大。每服三十圓。蘿蔔湯下。不以時候。

又十八論云。但服蒲黃黑神散自瘥。

第六論曰。產後乍寒乍熱者何。

答曰。陰陽不和。敗血不散。皆令乍寒乍熱。產後血氣虛損。陰陽不和。陰勝則乍寒。陽勝則乍熱。陰陽相乘。則或寒或熱。若因產勞傷臟腑。血弱不得宣越。故令血敗不散。入於肺則熱。入於脾則寒。醫人若誤作瘧疾治之。則繆矣。陰陽不和。宜增損四物湯。敗血不散。宜奪命丹。

又問二者何以別之。

答曰。時有刺痛者。敗血也。但寒熱無它證者。陰陽不和也。

◉增損四物湯

當歸洗去土并蘆須。切、焙。芍藥洗、剉。人參去蘆。切片。川芎洗、剉。各一兩。甘草四錢。炙。乾薑一兩。宜用生薑代之。

右爲末。每服二錢匕。水一盞。生薑五片。同煎六分。去滓。微熱服。不以時候。

奪命丹。見第二論。

又十八論云。但服蒲黃黑神散自瘥。

第七論曰。產後四肢虛腫者何。

答曰。產後敗血乘虛停積於五臟。循經流入於四肢。留淫日深。卻還不得。腐壞如水。故令四肢面目浮腫。醫人不識。便作水氣治之。血氣與水氣不同。凡治水氣。多用導水藥。極虛之。夫產後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。往往因致夭枉。但服調經散。血行腫消。卽愈。

◉調經散

沒藥另研。琥珀研。各一錢。桂去麤皮。不見火。剉。芍藥赤者。洗。剉。當歸去蘆須。切。各一錢。細辛去葉。剉。麝香研。各半錢。

右爲末。每服半錢匕。生薑汁、溫酒各少許。調勻服之。

又十八論云。但服蒲黃黑神散後。服轉藥瀉下惡物自瘥。轉藥是黑神圓。在第十二論後。

第八論曰。產後乍見鬼神者何。

答曰。心主身之血脈。因產傷耗血脈。心氣則虛。敗血停積。上干於心。心不受觸。遂致心中煩躁。臥起不安。乍見鬼神。言語顚倒。醫工不識。呼爲風邪。如此治之。必不得愈。但服調經散。每服加生龍腦一捻。得睡卽安。方見第七論。

又十八論云。但服蒲黃黑神散。自安。

第九論曰。產後月內不語者何。

答曰。人心有七孔三毛。產後血虛氣弱。多致停積。敗血閉於心竅。神志不能明了。又心氣通於舌。心氣閉塞則舌亦強矣。故令不語。如此但服七珍散即瘥。

◉七珍散

人參去蘆。切片。　石菖蒲簡密者。剉。　川芎洗、焙。　熟乾地黃各一兩。　細辛一錢。去葉。　防風去苗。剉。　朱砂研。各半兩。

右爲末。每服一錢。薄荷湯調下。不以時候。

又十八論云。但服蒲黃黑神散便安。

第十論曰。產後腹痛。又瀉痢者何。

答曰。產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷、當風。則寒邪乘虛進襲。留於肯膜。散於腹脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞泄腸鳴。或下赤白。腹脇膜脹。或走痛不定。急服調中湯立愈。若醫者以爲積滯取之。則禍不旋踵。謹之謹之。

◉調中湯

高良薑剉。炒。油　當歸洗去蘆須。切、焙。　桂去皮。不見火。剉。　白芍藥洗、剉。　附子炮去皮臍。　川芎洗。各一

兩。甘草半兩。炙、剉。

右爲麤末。每服三錢。用水三盞。煎至一盞。去滓熱服。

又十八論云。急服蒲黃黑神散。後服調中湯。

第十一論曰。產後遍身疼痛者何。

答曰。產後百節開張。血脈流走。遇氣弱則經絡分肉之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脈引急。故腰背不得轉側。手脚不能動搖。身熱頭痛。若醫以爲傷寒治之。則汗出而筋脈動踢。手足厥冷。變生他病。但服趁痛散。以嘿除之。

◉趁痛散

牛膝 切。酒浸一宿。控乾。慢火炒。焙乾。 當歸 去蘆須。切。焙。 白朮 剉碎。焙乾。 黃耆 蜜炙、剉。 桂 去皮。不見火。剉。 獨活 去蘆。剉。川中者尤佳。 生薑 切。各半兩。 蒲曰 洗、切、剉。 甘草 炙。剉。各一分。

右爲麤末。每服半兩。水五盞。煎至兩盞。去滓熱服一盞。次一盞續後再煖服。不拘時候。

又十八論云。但服蒲黃黑神散卽愈。

第十二論曰。產後大便祕澁者何。

答曰。產後水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便祕澁不通也。若過五六日腹中悶脹者。此有燥糞在臟腑。以其乾澁未能出耳。宜服麻仁圓以津潤之。若誤以爲有熱而投之以寒藥。則陽消陰長。變動百出。

性命危矣.

◉麻仁圓

麻仁研碎.　枳殼去穰.剉.麩炒微黃.　人參去蘆.切片.　大黃煨.剉.　各半兩.

右爲末.煉蜜圓桐子大.空心温湯下二十圓.未通加圓數.

又十八論云.產後小便出血.大便澁痛者何.

答曰.敗血流入大小腸.大小腸澁滯.致小便澁塞.大便艱難.人多不識.作五淋治之.不愈.但服蒲黃黑神散.後服黑神圓.取下惡物卽安.

◉黑神圓

巴豆去皮.以水二椀.煮盡爲度.去心膜.細研.去油.　黑附子炮去皮臍.切片.　肉桂去皮.不見火.剉.　白乾薑炮.　各半兩.

右爲末.麵糊圓如蘿蔔子大.每服三圓至五圓.熱茶下.卄以熱茶投之.卽行.前第七論中云轉藥者.卽是此方.切不可服尋常取積藥.

第十三論曰.產後血崩者何.

答曰.產後傷耗經脈.未得平復.而勞役損動.致血暴崩下.淋瀝不止.或因鹹酸不節.傷蠹榮衞.氣衰血弱.亦變崩中.若小腹滿痛.肝經已壞.爲難治.急服固經圓以止.

◉固經圓

艾葉（揀淨、剉碎、炒黃、）赤石脂　補骨脂（略炒香、）木賊（去根節、）各半兩、附子一枚（炮、去皮臍、切片、）

右爲末、陳米飲和圓、桐子大、食前溫酒下二十圓、米飲亦得、如陳米飲難圓、卽入雪糕少許搜和、卽易圓也、

又十八論云、但服蒲黃黑神散及黑神圓立瘥、

第十四論曰、產後腹脹悶滿、嘔吐不定者何、

答曰、敗血散於脾胃、脾受之、不能運化精微、而成腹脹、胃受之、則不得受納水穀、而生吐噦、醫者不識、若以尋常治脹止吐藥療之、病與藥不相干、轉更傷動正氣、疾愈難治、但服巨勝湯必瘥、

◉巨勝湯

赤芍藥（洗、剉、）　半夏（湯洗七次、切碎、）　澤蘭葉（洗、曬、）　人參（去蘆、切片、）　陳皮（去白、）　甘草（炙、剉、）各一錢、

生薑半兩、

右爲麁末、用水一椀、同煎至兩盞、去滓、微熱、分三服、

又十八論云、急服蒲黃黑神散、次服黑神圓、吐出惡物卽安、

第十五論曰、產後口鼻黑氣起及鼻衄者何、

答曰、陽明者、經脈之海、起於鼻、交額中、還出俠口、交人中左之右、右之左、產後氣消、血散、榮衞不理、散亂入於諸經、卻還不得、故令口鼻黑起、及變鼻衄、此緣產後虛熱變生此疾、其疾不可治、名曰胃絕肺敗、遇

有此疾。急取緋線一條。幷產婦頂心髮兩條。繫兩中指上節卽止。無藥可療。亦厭禳之一端也。

又十八論曰。產後口鼻黑氣起者何。

答曰。產後敗血入臟腑。旣滿衝於頭目。卻還不得。口乾、舌焦、鼻衄、黑氣。是產後熱變作此候。不可治也。名曰敗肺。

第十六論曰。產後喉中氣急喘者何。

答曰。榮者血也。衞者氣也。榮行脈中。衞行脈外。相隨上下。謂之榮衞。因產所下過多。榮血暴竭。衞氣無所主。獨聚於肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。爲難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰於肺。亦令喘急。如此但服奪命丹。血去喘息自止。奪命丹方見第二論。

又十八論曰。產後喉中氣急喘者何。

答曰。產後敗血過於心。轉於喉中。此不可治也。

第十七論曰。產後中風若何。

答曰。產後五七日內。強力下牀。或一月之內。百日之中。傷於房室。或懷憂發怒。擾蕩冲和。或因灼艾。傷動臟腑。得病之初。眼澁、口噤、肌肉搐搐。以漸腰脊筋急強直者。不可治。此乃人作。非偶爾中風所得也。

第十八論曰。產後心痛者何。

答曰。心者血之主。人有伏宿寒。因產大虛。寒搏於血。血凝不得消散。其氣逆上衝擊於心之絡脈。故心痛。

但以大巖蜜湯治之。寒去則血脈温而經絡通。心痛自止。若誤以爲有所傷療之。則虛極寒益甚矣。心絡寒甚。傳心之正經。則變爲眞心痛。眞心痛者朝發夕死。夕發朝死。藥不可輕用如此。

◉大巖蜜湯方

熟乾地黃洗・酒浸一宿・當歸洗・去蘆須・吳茱萸揀去枝梗・獨活洗・蜀中者尤佳・芎藭洗、劉用・芎藭洗、劉・乾薑炮、劉・甘草炙、劉・桂去皮・不見火・劉・小草遠志葉・各一兩・細辛半兩・去葉・勿用馬蹄香・

右爲麤末。每服半兩。用水三大盞。煎一盞。去滓。再入蜜一匙。又同煎三兩沸。微熱服。食前。

第十九論曰。產後熱悶。氣上轉爲脚氣者何。

答曰。產後血虛生熱。復因春夏取涼過多。地之蒸濕。因足履之。所以着而爲脚氣之疾。其狀熱悶掣瘛。驚悸。心煩。嘔吐氣上。皆其候也。服小續命湯兩三劑。必愈。若醫者誤以逐敗血藥攻之。則血去而疾益增劇。

◉小續命湯

人參去蘆・切片・黃芩尖如錐者・桂去麤皮・不見火・麻黃去節・防己剉碎・川芎洗、剉・芎藭洗・甘草炙・白朮剉・各一兩・附子一箇去皮臍・防風一兩半去苗・生薑五兩洗去皮・切・

右爲麤散。每服半兩。用水三大盞。煎至一盞。去滓。温服。

第二十論。產後汗出多而變痙風者何。

答曰。產後血虛。肉理不密。故多汗。因遇風邪搏之。則變痙風也。痙者。口噤不開。背強而直。如發癇狀。搖頭

馬鳴。身反折。須臾復發。氣息如絕。宜速斡口灌小續命湯。稍緩卽汗出如雨。手拭不及者不可治。此方不特治產婦。凡男女偶中此疾。急以此藥灌之。無不愈也。或服它藥則不及矣。

第二十一論曰。產後所下過多。虛極生風者何。

答曰。婦人以榮血爲主。因產血下太多。氣無所主。唇青肉冷。汗出目瞑。神昏。命在須臾。此但虛極生風也。如此急服濟危上丹。神良。若以風藥治之。則誤矣。

◉濟危上丹

乳香（以竹葉盛。又以竹葉覆上。熟斗略熟過。卽研成末。）　五苓脂（不夾石者。研。）　硫黃（研如粉。）　太陰玄精石（研）　陳皮（去穰。剉碎。）　桑寄生（剉。）　阿膠（剉碎。同蛤粉炒炮起。篩去蛤粉用。）　卷柏（生用。）　各一兩。

右將上四味同研勻。石器內微用火炒動。勿令焦。炒了再研極細後。入餘藥末。用地黃汁打糊。圓桐子大。產後溫酒下二十圓。當歸酒亦得。

又十八論曰。產後血氣逼肺。上氣咳嗽多縱睡者何。

答曰。產後滿月。血脈未通。好食熱麵。壅結成痰。或有氣塊。發時衝心。心痛氣急咳嗽。四肢寒熱。心悶。口乾。背膊痠疼。睡夢驚狂。體虛無力。時有汗出。心痛。月候不來。名曰敗癥。腹痛遶臍。面色微赤。因此不療。縱然得較。三兩日又發。急服黑神散立愈。

論臨月將息

凡產婦合要備急湯藥。並須預先修合。題號。恐臨時倉卒難致。臨月忌勿多飲酒。卽依產圖方位。擇深靜房室。八月一日卽用借地法。於房內北壁薰令香潔。

論新生小兒

凡新生小兒。急以綿裹指頭。拭兒口中惡物。不爾流入腹中。後生諸疾。斷臍可長三寸。臍中若有蟲。急撥去。恐入腹內。綳了取生甘草寸餘。搥碎。水一合。煎濃汁。以綿包子。點兒口中。當吐出惡汁。盡半合無妨。又取細研朱砂末一字許。以熟蜜調。置兒口中。令嘔之。去驚邪。三日湯煎虎頭骨少許。豬膽汁少許。和湯浴兒。少驚無瘡。令無惡疾。每日頻就無風明處。看兒上膞。若有一點白泡。如竹膜起處。速以指甲刮破。更生更去之。除灸臍帶外。則勿加火艾。恐成驚癎。若有冷熱夜啼。臍瘡不乾。變蒸諸疾。自別有方治之。今錄盧江劉寶助教經効小兒名方四道。

◉注唇膏。治初生孩兒衆疾。療胎風病。

朱砂研細。　坯子臙脂各一錢。　白殭蠶七箇。炒去絲嘴。　牛黃半錢。研。　蝎梢半箇。

右曰殭蠶、蝎梢。用薄荷汁一合。重湯煮汁盡爲度。焙乾爲細末。研入坯子朱砂等。生蜜和爲膏。逐日頻與孩兒注唇。令自吮嚥取効。

◉豆蔻散。治小兒夏月滑瀉。冷痢不已。腹痛、瘦瘁、食下卽嗯。

肉豆蔻一箇。用餬餅麵一塊。如杏大。裹豆蔻。灰火中煨。不住攪轉。候色赤透熟。取出。到。焙乾。

右爲細末。每服半大錢。七八歲至十歲者一錢。用温米飲調下。日三服。一兩日間愈。

◉蝎梢散。治小兒胎風。及百晬孩兒臍風撮口。無能救療者。先用生腦子一字。填入臍心。上用艾炷灸一七壯。如不覺。灸二七壯。再添腦子大妙。候定。服蝎梢散。

蝎梢四十九箇。用薄荷葉逐箇捲以絲扎定。於砂銚中滾轉。炒令薄荷乾蘇爲度。

白殭蠶四十九箇。生薑汁浸。炒乾。去觜。

右二味爲末。入生腦子抄半錢麝香少許。研勻。用紫色雄鷄肝煎湯。調下末半錢許。併三兩服愈。

◉治小兒諸般齁喘疾。

烏雞卵一箇。輕粉少許。

右將雞卵於尖小一頭打小穴子。入輕粉在內。用杖子攪轉令勻。坐雞卵於飯上蒸熟訖。將與患者小兒喫。只一枚取効。

累用經効方　隆興府學諭張世臣方。

◉大聖澤蘭散。治婦人血海虛冷。久無子息。及產後敗血衝心。中風口噤。子死腹中。擘開口灌藥。須臾生下。便得無恙。幷治胎墮。腹中攻刺疼痛。橫生、逆產、胎衣不下。血運、血癖、血滯、血崩、血入四肢。應血臟有患及諸種風氣。或傷寒吐噦咳嗽。寒熱往來。遍身生瘡。頭痛、惡心。經脈不調。赤白帶下。乳生惡氣。胎臟虛冷。數曾墮胎。崩中不止。因此成疾。及室女經脈不通。並宜服之。常服暖子宮。和血氣。悅顏色。退風冷。消除萬

病兼療五勞、七傷、虛損等病。

澤蘭葉去根、曬乾。石膏研。各二兩。生乾地黃一兩半。剉。用溫湯浴過。桂肉一兩一分。剉、不見火。用。

吳茱萸湯洗七次。炒。厚朴去麤皮、剉碎。用薑製一宿。炒乾。白茯苓去皮、剉焙。卷柏去根。剉。細辛去苗幷葉。焙。

柏子仁別研細。防風去苗。剉。桔梗去蘆。焙。白蘞羌各一兩。白朮切片。焙。白芷去梢。

丹參洗、剉、乾薑炮烈。焙。五味子去枝梗。剉。藁本去蘆頭。人參去蘆頭。切。川芎炮去皮臍。

川椒去目及閉口者。微炒出汗。黃耆剉、去蘆頭。各三分。阿膠剉碎、蛤粉炒泡起、去粉用。白薇剉、焙。各半兩。

當歸去蘆須、洗。切片子。焙乾。白芍藥剉。甘草炙、剉。川芎各一兩三分。

右爲細末。每服二錢。空心臨臥熱酒調下。若急疾有患。不拘時候。

◉奪命褐散子。姙娠四五月已上。忽然仆地。手足抽掣。咽中涎聲袞袞。口眼不開。如小兒瘈瘲之狀。名曰胎癇。

甜葶藶紙上微炒。芫花醋煮乾、焙燥。各半兩。郁李仁湯浸去皮。地榆剉。各一分。

右爲細末。每服一字。煎沉香人參鉤藤鉤子、防風湯調下。如牙噤者。用物斡開灌下。調藥汁不過一匙。不拘時候。沉香但磨藥汁尤妙。如醒時只用防風煎湯。調四君子湯。服蘇合香圓及大聖澤蘭散半月餘。其病脫然。恐目昏不能視物。不必疑慮。氣血凝靜。自然光明。謹勿服眼藥。有三四婦人皆患此證。寸口脈伏。自關而下脈弦。蓋伏者氣不上升。弦者有飲在內。此必因胎肥流飲不化。注入胎宮。與血相搏。

子不安靜。故氣不上升。乃胎觸心絡。遂有胎癎之證。先是醫者用安胎養血之藥未効。遂以此藥。緣此證雖是產前之疾。卻當作產後治療。迺是血不循經。氣不升降。氣閉血壅。其狀如癎。當導氣而逐其飲。氣通飲消。則血循經。入養胎安氣。則子安靜矣。累用經驗。

◉地榆降血飲子。治妊娠入月臨草之時。血出三日而子未下。手足不收。昏昏如醉。不省人事。此迺漏血過多。血不養胎。心氣逆上。胎氣留連。此名胎乾。此藥治之。神効甚速。

蘇子降氣湯一貼。乃捌味者是。只作一服。加地榆一錢半。洗淨麥門冬十粒。去心。水一盞半。生薑二片。煎七分。去滓。入乳香少許。透明者。鎔開。溫服。不能自飲者。扶起灌之。

◉大安胎飲子。治妊娠胎氣不安。腹脇刺痛。經脈適來。氣急上喘等疾。

當歸洗去蘆須。切片。焙乾。　乾地黃剉、洗。浸。乾。再焙用。　川芎洗。剉。　赤芍藥剉。　地榆剉。　各一兩。

阿膠剉碎。蛤粉炒泡起。去粉用。　熟艾各半兩　黃芩一分。剉。

右爲麤末。分作十五服。每服水二盞。煎至六分。去滓。通口服。不拘時候。

◉吳白朮散。安胎養氣。常服。十月中胎氣安定。無諸疾苦。

白朮去蘆。切片。焙。　人參去蘆。切片。焙。　白茯苓去黑皮。剉。焙。　甘草炙。剉。　阿膠剉碎。蛤粉炒泡起。去粉用。　已上各等分。

右爲咬咀。每服三大錢。水一盞半。煎至七分。去滓。溫服。不拘時候。

一滑胎。榆白皮爲細末。每服一錢。空心白湯調下。自入月每日三服。令易產。兒生下。藥皆塗身上。

一催生并死胎不下。草麻子三箇。巴豆四箇。研細。入麝香少許。貼臍心上。須臾間便下。

一難產三兩日不生。以蠶種紙半張。燒灰。熟水調下。係已出蠶種紙。亦名馬明脫。

一治橫生、逆生、炙產婦右脚小指尖頭。如麥大三壯。立產。

又方。蛇退皮燒灰。酒調二錢。面東服。

又方。鹽塗兒足底。急去之。

又方。車前子末。酒服二錢。

一妊娠煩悶、胎熱、睡臥不得。并腹中痛。又難產。知母新白者焙乾爲末。煉蜜圓如小彈子大。每服一圓。温酒化下。

一妊娠偶因所觸。或墜高傷折。致胎動不安。腹中痛不可忍者。縮砂不以多少。和皮炒令熱透。去皮爲細末。每服二錢。熱酒調下。胎卽安。神効。

一胎動。日夜叫呼。口噤。唇青。及下痢不止者。熟艾一兩。酒五盞。煮四盞。去滓再煎至二盞。服。口閉者灌之。亦治腰痛下血。

一胎動及下血。心腹脹者。當歸二兩、川芎一兩爲麤末。水四盞。酒五盞。煎至五盞。分三服。若胎未死卽安。已死卽便下。

一產後血暈。五靈脂炒令煙盡爲細末。温酒調下一錢。童子小便尤佳。

又方乾荷葉爲細末每服一錢溫酒調下
又方生半夏爲末一大豆許吹鼻中
又方紅花或蘇枋木酒水濃煮汁飲
一產後中風眼上視四肢搐搦荊芥穗爲末每服二錢溫酒調下如不飲酒只濃煎湯服
一產後發狂每用大香附子去鬚皮淨爲細末每用二錢入研極細好辰砂末一錢以燒通紅秤槌浸好酒調服
一產前傷寒不問陰陽身熱頭疼白朮二錢、黃芩一錢薑末水一盞煎六分去滓熱服不計時候

衛生家寶產科備要卷第五

產科雜方

◉催生如聖散。此一方廬江劉寶助教經効名方。

黃蜀葵花不拘多少。

右一味。焙乾爲細末。每服二錢。熟湯放温調下。神妙。或有漏血。胎臟乾澁難產痛劇者。併進三服。良久腹中氣寬。胎滑。卽時產下。如無花。只用黃蜀葵子爛研小半合。以酒調。濾去滓。温飲尤佳。

◉救生散。安胎益氣。易產。

人參（去蘆。切片。）訶子（濕紙裹。煨熟。去核。）白朮（剉、炒黃。）陳橘皮（去白。炒。）大麥蘗（炒黃。）神麴（細剉。炒黃色。）各半兩。

右爲細末。每服二錢。水一盞。煎六分。温服。入月加一倍。用水二盞。煎一盞。温温空心服之。能令兒緊小。乳母無患。

◉罨胎散。治婦人妊娠傷寒。遍身大熱。悶亂。躁渴。痰甚則蒸損胎臟。廬江劉寶助教名方。

捲荷葉一兩（嫩者。乾。秤。）焙蚌粉花半兩（好細白者。秤。）

右爲細末。入粉研勻。每服二錢。以新汲水用蜜調下。日進兩服。

◉二聖散。產前安胎。產後治惡血不盡。及胎衣不下。

羌活洗去苗、川芎洗、剉、

右等分爲細末每服二大錢酒少許水七分煎七沸溫服。

◉羌活散治妊娠患時疾。

羌活去苗、剉碎、荆芥穗不見火、赤茯苓去皮、剉碎、川芎洗、焙、剉、宣州乾葛剉、焙、甘草炙、剉、川升麻剉、各一兩、陳皮去穰、

右爲細末每服三錢水一盞半入生薑五片薄荷十葉同煎至一盞稍熱服不以時候。

◉黃金散治妊娠患時疾。

黃芩尖如錐者、鬱金剉、各一兩、

右爲末每服一錢板藍根地黃水調下汗出効未得汗再服卽瘥又用鷄卵窠井至泥隔宿取出吞之必無虞矣。

◉薑粉散纔產服此藥蕩盡兒枕除百病源。

當歸洗去蘆須、焙、官桂去皮不見火、人參去蘆切片、茯苓白者去黑皮、甘草炙、芍藥洗淨、知母切、炒、川芎洗、大黃略炒、黃耆蜜炙、木香不見火、草豆蔻去殼、白朮剉、焙、訶子煨熟去核、高良薑剉、炒、靑橘皮去穰、熟乾地黃洗酒浸焙、

右除地黃外各等分剉焙乾次用附子一箇結實半兩者炮裂去皮臍切生薑一斤研取自然汁於椀

器中停留一食久傾去清汁取下面粉脚攤在蒟葉中入焙籠焙乾同衆藥擣羅爲末纔產後用藥末三錢水一盞薑三片棗子一箇擘開同煎至七分乘熱喫如喫藥之後自然產母睡着半日以來睡覺再服全除卻腹痛一日只可三服至九服不可多服恐肚中冷也

◉香蓮散治產後咳噦

石蓮十箇（炒熟）　丁香十箇

右爲末用水三合煎十沸温服

◉地黃散治產後血痛如刀刺

熟乾地黃（洗酒浸焙）　橘皮（去白刻焙）

右件等分爲末每服一錢粥飲調下尋常痛發可常服

◉香脂散治產後吐噦不止

狗膽一箇　硇砂　丁香　五靈脂各少許

右爲末以狗膽圓如白豆大每服一圓生薑水磨下

◉血竭散治產後百疾廬江劉寶助教名方

血竭　沒藥（剪碎）

右等分輕手研細頻羅再研取盡爲度每服二錢用小便合和細酒半大盞煎一二沸温調下纔產下

一服上牀良久再服其惡血自循下行更不衝上免生百疾

產後發熱名曰褥勞用猪腰子作粥治之猪腰子一隻去白膜薄切作柳葉片子少鹽酒拌之先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪椀底用熱粥蓋之如作盒生粥狀喫之每日空心做喫極妙

十八論中治產前後患蒲黃黑神散功効

第一產因熱疾胎死腹中胎死身卽冷口角沫出爪甲青黑色四肢逆冷但服此藥煖其死胎須臾自出

第二難產或橫生逆生胎衣不下此藥並治

第三產後衣不下但服此藥逐出衣中血逐自出如衣帶斷亦同

第四血暈醫人不識呼爲暗風但服此藥立瘥

第五口乾心悶醫人呼爲胸膈不利此名血結但服此藥立瘥

第六乍寒乍熱醫人不識呼爲瘧疾但服此藥立瘥

第七產後四肢虛腫醫人不識呼爲水氣蓋血氣隔四肢寒但先服此藥立瘥後服轉藥瀉了惡物轉藥謂之黑神圓

第八產後乍見神鬼醫人不識呼爲風邪但服此藥卽瘥

第九產後月內不語但服此藥卽瘥

第十產後腹痛兼瀉痢急服此藥後服調中湯調中湯是止瀉石灰散出產乳經中

第十一、產後遍身疼痛。但服此藥瘥。

第十二、產後小便出血。大便祕澁。人多作五淋治。不愈。但服此藥瘥。

第十三、產後血崩。謂惡露未盡。久不治之。及食鹹酸所致。若腹似痛時稍難治。肝家熱。背筋急。急服此藥。

後服黑神圓瘥。

第十四、產後血氣不通。上氣喘嗽。多睡。謂滿月後月脉未通。食熱麵壅結成疾。或有氣塊。發時衝心。心痛。氣急。咳嗽。四肢無力。乍汗出。心痛。月候不來。名曰敗癥。腹痛遶臍。面赤。宜服此藥即瘥。

第十五、產後心腹脹滿。嘔逆不定。醫呼爲飜胃。不愈。急服此藥。吐出胃中惡物即瘥。

第十六、產後口鼻黑色氣起。及鼻衄不治。

第十七、產後喉中氣急喘不治。

第十八、產後中風。爲無故下牀。百日之內傷房室。或因著灸有驚癰腑。中風之時。眼澁。腰背筋急。角弓反張。牙關閉定。不可治也。

蒲黃黑神散方。已見第一論末。

黑神圓方。已見第十二論末。

產前後十八論烏金散

婦人萬病。皆因血氣而生。就中產後乖違。誠難救療。百日之內。變證尤多。或坐卽運絕。臥卽口乾。經日多

言。還應心悶。或傷熱食。變作崩中。飲冷服涼。便成腰痛。敗血入腹。則脅脹虛鳴。惡露上衝。乃或嘔噦。脾之受血。發則傷寒。肝氣有邪。卽多嗔怒。肺之被撓。氣悶喘麤。胃藏未安。多爲腹脹。敗血流走。百節酸疼。留滯四肢。皮膚俱腫。失音不語。還因敗血入心。散爲淋瀝。亦是血之入腹。大抵虛弱積血所爲。三焦不調。衆疾皆起。卷尋方卷。多不會解。就中產前、產後之圖。難全眞訣。當貧困之輩。或居村中。念其急難。方當思慮。魂勞神悶。不知所裁。忽見一人形貌非常。乃言曰。余有秘術。子其知乎。不覺惕然瞻敬之際。復曰。子請存於誠信。心欲救人。事當甚喜。吾有產後一術。名曰烏金方。受於子。宜保惜之。余卽跪受要旨。頓覺精神爽易。事理照覺。在寤中神授。乃依方修合。普諸神願。遂成產後十八方如後。

第一論。問胎死腹中者何。

答曰。緣母患染熱疾。經六七日間。臟腑極熱。蒸薰其胎。是以子死。何以知之。身死便冷不居。子宮乃墜。臍下冷痛。口角沫出。腹冷爪甲青。四肢逆冷。命在須臾。但以此三服。令胎熱。須臾自下。

第二論。問產難者何。

答曰。兒已成形。每食母之血。候十月當足。月血有餘。乃結成塊。俗呼爲兒枕子。欲生時。兒枕先破。爲敗血散裹子身上。固當難產。但服此散三服。敗血卽散。須臾自產。或逆產其體不同。悉皆治之。

第三論。問胎衣不下者何。

答曰。產訖。敗血流入胞衣中。被血脹。固當難下。但服此散。衣中血散。須臾自出。若胞衣帶斷。亦宜服此

散卽下、

第四論問血暈。產後三日起止不得。眼前自見鬼神。或悶絕不識人者何。

答曰。產後三日。血氣未安。運走五臟。奔於肺上。時人不識。呼爲暗風。以此治之。萬無一瘥。但服此藥。立可安瘥。

第五論問口乾、心悶。及煩渴者何。

答曰。產後七日以來。血氣未定。盖爲食於熱麵與血結在心卽渴。時人呼爲胸膈壅悶。若以此治。萬無一瘥。但服此散立瘥。

第六論問產後乍寒乍熱及渴者何。

答曰。產後虛羸。敗血入於肺則熱。入於脾則寒。乃渴。時人不識。呼爲瘧疾。若以此治。萬無一瘥。服此散立瘥。

第七論問產後四肢浮腫及寒熱者何。

答曰。敗血流入五臟將滿。卽四肢停留日久。卻還不得。乃欲爲腫。時人不識。呼爲水腫。且如水腫與血腫不同。何以明之。水氣喘而小便澁。血氣渴而四肢寒。先服此散。次服宣元。瀉下惡物自瘥。宣元是黑神圓。

第八論問言語顛狂無度。若見鬼神。或寒熱及渴者何。

答曰。產後敗血衝心。心不受邪觸。被敗血蒸薰。心悶蒸熱。煩渴至躁。言語顛狂。時人不識。以爲風及神邪所致。若以此治之。萬無一痊。但服此散愈。

第九論。問產後不語者何。

答曰。夫人心有七孔三毛。產後敗血上行。流入心孔之中。被血閉之。卽使不語。時人不先去心孔敗血。其病不除。但服此藥。當漸語也。

第十論。問產後腹痛及痢者何。

答曰。產後未滿月間。誤飲冷水。水與血相和。流入大腸。大腸受之。血遂成病。水穀不化。或泄或脹。膿血不定。急服此散。次服調中湯立効。

第十一論。問產後遍身疼痛者何。

答曰。產後百節開張。敗血流入四肢。留滯日久不散。結聚虛脹。是致疼痛。但服此散。遂去百節間敗血。須臾自定。

第十二論。問產後瘀血及小便赤澁。大腸痛者何。

答曰。敗血流入小腸。閉卻水道。卽小便艱澁。流入大腸。閉卻肛門。是致大小便俱難。醫人不識。呼爲五淋。治之萬無一痊。但服此散。次服黑神圓。聚結物出。其病立愈。或用洪氏方中排濃內補散。依方服立効。

第十三論。問產後崩中者何。

答曰。敗血惡露未止。日久或食鹹酸之物。遂變崩中。血結變黑。狀似雞肝。或時寒熱。背膊拘急煩悶。名曰崩中。宜先服此散。次服黑神圓即安。

第十四論。問產後血氣不調。道路閉塞。兼咳嗽多驚者何。

答曰。產後滿月後。月經未還。不能謹忌。好食熱麵。遂即成疾。積聚結塊。發即氣急、咳嗽。四肢寒熱。心悶口乾。背膊拘急。煩躁。夜夢驚悸。體全無力。多汗心疼。月經不來。名爲血癥。腹痛多睡。面色多赤。因茲不療。遂成骨蒸。治須子細。看此疾狀。或服別藥十無一應。終不得瘥。只服此藥。其患自退。

第十五論。問腹肚脹滿吐噦者何。

答曰。產後敗血停於脾胃之間。氣遂相衝不定。即留滯嘔噦。胸脇俱脹。時人不識。呼爲醋胃。以此治之。萬無一存。急服此藥。吐出胃中惡物。即便喫粥。

第十六論曰。產後口鼻黑色。及鼻衄者何。

答曰。敗血傳入臟腑。臟腑既滿。衝於頭面。卻還不得。焦乾白黑。見於面色。衝於鼻即鼻衄、黑起。緣產後虛熱甚。變成此狀。若別治之。萬不得一。此名心肺敗血。宜服此藥。

第十七論。問產後喘急。喉中如貓兒聲者何。

答曰。敗血衝入心肺。氣與血併。遂結爲塊。入於喉中。如有此狀。急服此藥。

第十八論。問產後中風兼有黑血點者何。

答曰。產後七日內。下床衝風。百日內傷房勞。或有灸瘡中風。取性慢易。卽中風也。初中之狀。氣澁腰痛。筋急如角弓反張。牙關緊急。若有此狀。卽是風邪所入。或面色黑遍身赤黑。敗血流入臟腑。臟腑皆滿。流入皮膚。退反不得。變成血點。或得此變。急服此藥。無有不瘥。

◉宣經圓

巴豆十五粒。去皮、心膜。用生絹袋子盛。以灰汁煮十餘沸。取出研。紙壓油了。重研。

右件先用烏金散三錢。以無灰酒調似糖。入甕瓶中。於重湯內熬成膏。入巴豆末同和爲圓。如菉豆大。熟水下十五圓。宣了冷粥補之。忌毒物。

◉烏金散

頭髮灰男子者。不須洗。燒灰。　鯉魚鱗燒灰。　當歸焙。去蘆須。　延胡索生用。　好黑煆過。　肉桂不見火。去麤皮。

麒麟竭　赤芍藥剉。　百草霜是鍋底刮下者煤。

右件九味等分。杵羅爲末。每服二錢。溫酒調下。又用童子小便半盞。生薑一塊。同煎調下。入麝香少許。更妙。

產前所忌藥物。盧醫周鼎集以爲歌。

烏頭、附子配天雄。
蚖斑、水蛭、地膽蟲。
烏喙、側子及蚣蟲。
蹶蹙、野葛、蝼蛄類。

牛黃、水銀幷巴豆、
牛膝、藜蘆、加薑苡、
牙朴、芒硝、牡丹、桂、
代赭、蚱蟬、胡粉、麝、
槐子、牽牛幷皂角、
欖根、硇砂與乾漆、
瞿麥、艬茹、蟹爪甲、
馬刀、石蠶、衣魚等、
乾薑、蒜、鷄及鴨子、
切忌婦人產前用、

大戟、蛇退共蜈蚣、
金、石、錫粉對雌雄、
蜥蜴飛生更蟋蟀、
芫花、薇銜草、三稜、
桃子、蟭螟和茅根、
亭長、溲疏、茺草中、
蝟皮、鬼箭、赤頭紅、
半夏、天南通草同、
驢、馬、兔肉不須供、
此歌宜記在心胸、

衞生家寶產科備要卷第六

備產濟用方序

婦人產褥之事。一有蹉跌。爲害不細。若因而受疾。又非尋常疾病之比。氣血既虛。更難攻治。是宜昔人所留意而不敢忽者也。予性喜方藥。偶得產方甚多。蓋嘗用以取効焉。今錄其所得之方。及平時所聞之說。與夫疾證用藥次第。共爲一書。以濟人之急難。初虞世嘗謂婦人生產。須使之自能通曉。方爲盡善。斯乃至論。然間有素無產難之家。不知出於偶然。心常易之。不以介意。故緩急之際。至於產婦已困而家人未悟者。往往有之。此幸其無事則可。非萬全之道也。紹興庚申重陽日。三吳外士餘杭虞汸書。

虞氏備產濟用方

妊娠

婦人妊娠之後。或觸冒風冷。或飲食不節。或居處失宜。或勞動過當。少有不和。則令胎動不安。重者遂致傷墮。臨產之際。爲患不小。豈可不戒也。

妊娠三箇月後。或疑非胎。宜服川芎散。妊娠五箇月後。宜服滑胎枳殼湯。

入月

入月第一日清旦。先書借地法。貼產婦房內北壁上。須清心志誠書之。更須避日遊月支諸神等。

入月後每日進保生圓一服。臨產五臟不痛。其子易生。

凡產閣及藏衣之地。並須依方位所利鋪設。產閣務要清虛。仍須遮塞孔隙。無令賊風遊氣可得而入。及窗壁仰泥之類。並須一一經心照管。恐有顛覆。種種非意。爲害不小。入月後須便擇好日爲之。倉卒之際。無緣周備也。

凡合用湯藥。須於未產前一月內修合足備。不可倉卒或市諸藥肆。或求之醫篋。產後五臟皆虛。藥貴精當。恐有雜僞。反致他疾。產婦服食。貴在誠潔。老娘須擇溫善安詳慣熟之人。其妄誕揮霍無常者去之。又有喜驚動人而收己功者。爲害尤甚。不可不知也。大抵有孕婦之家。選擇老娘。最爲先務。既得之。則令與產婦游處情熟。入月則令守月。不可臨時倉卒呼喚。卻致誤事。又老娘收生。風俗多有不同。閑時宜先令詳說次第。或有未便。款曲與之商量。不可一切任之。此若選擇得人。則上下安心。產婦亦免憂疑。省力萬倍。腰生只用家中慣熟妮子爲佳。若用外人。亦須先審問次第。然後用之。亦能爲害。不可不謹也。

臨產

產婦覺腹痛。他人切不得驚忙及亂報人知。只可令一兩人老成親熟人。安慰相伴。亦不得用人多。不然。則令產婦憂怕。氣血錯亂。生理不和而起百疾。

產婦腹痛時。須低心忍耐。不可急性懆怒。起動揮霍。皆能令子失道。遂致難產。產婦若只腹痛者未產。若連腰痛甚者。卽產候也。

產婦腹痛雖甚。且須令人扶持。徐徐不住行動。若倦亦且扶立。時時令行。先脫產婦常着衣服一件。覆籠頭上。待子逼生。方得蹲坐。切不可蹲坐太早。太早則子在腹中轉動不得。遂致難產。產婦臨產。須避太歲所在。不得面對太歲蹲坐。恐致憂禍。深戒深戒。產婦蹲坐時。須要四體平正。不得稍有偏曲及強嘔氣用力。亦能令子失道。致難產也。

產婦未蹲坐時。先須用五積散四錢。加順元散二錢同煎。分作兩服。用湯煖卻不得令冷。候蹲坐時。令產婦先進一服。如稍覺產遲。卽再進一服。若一服後便產。卽不須再服。此藥助氣催生。他藥所不及。吾鄉所謂沈家五積散者是也。方出沈存中內翰宅。昔有貨者。三百一服。號爲神藥。余家每用之取効。但性稍熱。產婦素協熱者服之。產後臟腑須微覺燥澁。甚者三兩日不通。切不可用利性藥。但調和粥食。如後說調養津液生則自然流利也。說在產後諸證用藥門。

產後

幾分殞。便須急與產婦童子小便一盞溫服。次進勝金湯一服。不可飲酒過量。緣酒能引血入四肢作病。兼新產後。臟腑虛熱。酒入腹中。必致昏亂。又嘗有人用醋墨。此雖破血有功。然亦傷肺。服多則因而成嗽。余見蜀醫張宗說。說有用醋墨者。下咽疾作。此是氣血方虛。酸勝而生痰。不可不戒。才分殞。便須燒塼石或炭投醋中。三日內嘗令聞猛醋煙氣。以防血暈。又不得令熟睡。須頻頻喚醒。緣氣血全虛。恐生昏亂。分殞後不得便睡。且須扶坐移時。方可以軟物自腰以上漸漸搭起。及高枕起頭項。仍須令仰臥。立起膝時。

復令人從心上用手按到臍下。如此一日已來方可止。恐惡血上行而致暈也。兼須加意遮避賊風。不可不謹。

產後所進粥藥。不得犯生水。以至椀器之類。並須用沸湯洗。火炙乾。方可用。產後七日內。唯須頻進童子小便。及時進白粥。如小便難喫。則依法漬之。自然易喫也。七日後方可進少醇酒幷些小燒鹽。不可用生鹽。二七日後漸進些小淡煮極麤爛胳肉。三七日後漸食滋味。一月後漸進麵食。一百日後。方可食果實生冷等物。產後五臟百脉。率皆傷動。一百日後。方始如舊。常人不自愛惜。才到滿月。便稱平復。或不謹飲食。或觸冒風冷。或喜怒高聲。或勞動用力。氣血未定。情慾不常。此皆致病之由也。婦人稟受虛實。皆緣生產而能移易。若能一一如法將息補養。則有平生虛怯多病。而遂盛實無病者。若不能如法將息補養。則有平生盛實無病。而遂致虛損瘦瘠。成纏綿不可起之疾者。當時不覺。意謂不然。及歲月成疾。又不能推究其由。乃謂偶爾。故婦人產後。往往不能加意將攝。噫。臨產之際。死生所繫。及產難既過。漸向平復。而又不能將息以自保攝。遂取困厄。豈不至愚哉。世之任意輕動不能調養者多。故詳言之。

產後諸證用藥例

產後惡露或多或少。皆能令人暈悶。心煩滿急。

產後惡血攻心。則能令人眼生黑花。心悶欲絕。產後才覺惡心、頭旋、頭昏。多涕唾。身如在舟車中。此是血暈之候也。便以猛醋煙燻。及服保生圓、勝金湯、百草霜散等。治血藥則如熟乾地黃、生薑、芸臺子、當歸、蒲

黃、涼沒藥、桂心、延胡索、赤芍藥、牡丹皮、牛膝、川芎、麒麟竭之類。

產後惡血攻心。則荒言亂語。驚怕。或啼或笑。宜服金黃散。麒麟竭散等。破惡血。養好血。藥則如琥珀、熟乾地黃、當歸、蒲黃、涼赤芍藥之類。安心氣則如遠志、茯神、朱砂、麝香之類。

產後惡血不絕。爲自來經血虛損。或產時惡血出不盡。留滯腹中。先有宿冷。遂成淋瀝不止。宜服保生圓等。如牡礪、當歸、熟乾地黃、艾葉、阿膠、厚朴、乾薑之類。性冷藥不可服之。

產後因惡物不下。或下不盡。心腹疼痛煩悶。宜服千金散、地黃散、桃仁散、川芎散、勝金湯、保生圓等。又宜服桂心當歸牛膝、牡丹皮、虎杖、蓬莪茂、延胡索、赤芍藥之類。產後須常體問產婦。如所下惡物多。卽不須再三進逐惡血藥。恐氣血益虛。煩悶暈亂。及生疾病。如覺比尋常少。或不行。則須急攻之。緣血隨氣上行。掩於心。故令煩悶而心滿急。二者得失甚大。切在詳審。產後大腸祕澁。此是產時走津液多。腸胃未和。乃常事也。切不可亂服通利藥。但只依尋常服調氣血藥。及調粥食。常令温煖細軟。依時漸進。不得失飢。亦勿傷飽。氣血調和。則腸胃自然平復矣。

產後體虛。切不可妄進湯藥。如別無證候。但只與保生圓。及調養氣血等藥。

產後三日。起坐不得。眼見黑花。目或暈絕。全不見物者。是血氣未安。運走五臟。奔注於肝故也。有不識者。呼爲暗風。慨矣。宜服黑散子。

產後乍寒乍熱。及渴者。是產後虛羸。敗血入心肺則熱。入脾則寒。不識者呼爲瘧疾。慨矣。宜服黑散子。

產後四肢浮腫及寒熱者是產後敗血流入五臟五臟將滿流入四肢停留日久卻還不得乃化爲水有不識者呼爲水氣悞矣血與水氣狀候不同何以明之水氣喘而小便澁血氣渴而四肢沉當細辯之宜服黑散子產後言語顛狂乍見神鬼時復寒熱及渴者是產後敗血衝心心不受觸既被蒸燻心臟熱極遂生此疾不識者呼爲風邪神祟悞矣宜服黑散子

產後一臘非時不語者是敗血上衝陷入心孔中既被蔽之便致不語宜服黑散子

產後遍身疼痛者是百節開張血疰結處停留不散結聚虛脹是以疼痛宜服黑散子骨間敗血卽去

產後雖滿月血氣不通上氣咳嗽痰涎多者經脉未還便不忌謹多食熱麵壅結戕疾聚卽戕塊散卽上衝氣急咳嗽四肢虛熱心悶口乾睡夢多驚四肢無力盜汗心痛月候不調或成血癥環遶臍下或卽面赤因變骨蒸但多服黑散子卽瘥須急服之此疾難理故也

產後敗血停在脾胃食衝於胃胃衝於氣氣衝卽不安便當吐噁胸脇俱脹有不識者呼爲醫胃但服黑散子吐出惡物卽瘥

產後中風者是未經七日下床兼百日內傷房事或灸瘡內中風也初中之狀眼澁腰強筋急如角弓反張牙關緊急若此之狀非中風也有此疾者安能救療婦人傷犯之後其疾甚多不可不戒

產後面色黑及遍身生黑醫子由敗血入皮膚欲出流走熱結便住卻還不得遂戕黑醫中此者百無一瘥

難產逆產橫產

難產、逆產、橫產三者。皆能立致不測之禍。然所得多端。或先因漏胎。血去臟燥。或子臟宿挾疹疾。或觸犯禁忌。或產時驚動。穢露下早。子道乾澁。產婦疲困。或坐臥未安。身體斜曲不正。轉動忽遽。強嘔氣暴衝擊。或腹有兒枕。產時先破。遂爲敗血散裹其子。胎中伏熱。故致難產也。產時未至。驚動太早。子轉未覺。便用力產之。故致逆產橫產也。產婦面赤舌青者。子死母活。面青舌赤沫出者。母死子活。唇口青兩邊沫出者。子母俱死。身更重而熱。舌下脈青黑。及胎上冷者。子已先死。並有方治之在後。

胎衣不下

產婦初時用力產子。而體已疲憊。不能更用力。產胎經停之間。外冷乘之。則血道乾澁。胎衣不下也。子臍帶與胞系相連。若不下。卽須急治之。不然。則斷臍稽遲。子傷冷氣而成病矣。舊方胞衣不下。恐損子者。須依法截臍。胎衣不下者。腹痛滿則殺人。若倉卒無藥。卽多食猪脂亦佳。

妊娠食忌

食兔肉令子缺唇。　食雀肉令子盲。　食羊肝令子多患。　食鴨子令子倒生。

食鼈肉令子項短。　食驢肉令子過月。　食乾薑蒜令胎不安。已上並妊娠五個月之後、則當忌食。

入月借地法

東借十步。西借十步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。此中產婦安居。無所妨礙。無所畏忌。諸神

擁護.百鬼速去.急急如律令.

十二月產臥藏衣吉凶方位圖



正月丙產．壬藏．　二月庚甲產．坤藏．　三月壬產．丙藏．　四月庚產．甲藏．　五月壬產．丙藏．　六月甲產．庚藏．
七月丙產．壬藏．　八月甲庚產．艮藏．　九月丙產．壬藏．　十月甲產．庚藏．　十一月壬產．巽藏．壬　十二月甲產．庚藏．

產前諸方

◉川芎散 三箇月後．疑非胎即服．
川芎一兩生用．
右爲細末．空心濃煎艾湯調下二錢．腹內微動者．當有子也．

◉枳殼湯 五箇月後服．滑胎易生．
商州枳殼二兩麩炒去穰．　石州甘草一兩炙．
右爲細末．每服二錢．百沸湯點．空心食前．一日三服．或四服．唐胡陽公主每產．則經旬痛楚．萬法不效．服此藥．遂驗．自服藥後．忌登高厠．此方神妙．滑胎易產．他藥所不及．但其胎緊小．微帶黑色．百日後肉色方漸變白．唯產婦素虛怯者．更宜斟酌．緣枳殼性寒．恐難多服也．

◉蟹爪湯 姙娠僵仆失據．胎動轉上搶心．甚者血從口出．逆不得息．或注下血．胎不出則寒．冷入腹中．急如產狀．虛乏少氣．困頓欲死．煩悶反覆．服藥母卽得臥．下血亦止．其當產立生．神効．
蟹爪一升約五兩　阿膠二兩剉碎．　甘草炙、勿炒．　桂心不見火．　各二尺．
右以東流水一升煮取三分．去滓．內膠烊盡．能一服佳．不能一服者．食頃再服．若因急不能飲者．灌之．藥下子母俱活．子死則母活．若不經僵仆下血．服此湯卽止．

◉又方 姙娠偶有所觸．或墜高傷打．致胎動不安．腹中痛．不可忍者．可服．

縮砂一兩和皮用淨甎鋪於慢火上炒令熱透去皮只用仁

右爲細末每服二錢熱酒調下覺動處熱卽已安矣

◉又方胎不穩坐臥不安可服

木賊草去節　川芎剉　各一兩

右爲細末每服一錢水一大盞入金銀物同煎至六分去滓空腹食前日三服

◉人參圓婦人妊娠嘔吐不止名爲阻病或以尋常治嘔吐藥治之非也宜服此藥

乾薑炮烈　半夏麴炒　人參去蘆切　各一兩

右爲細末薄糊圓如雞頭大每服一圓米飮下可加至三圓此方出仲景金匱極妙

◉保生圓入月後服產前產後一切諸疾悉治

金鈆石斛一分別杵　秦椒去目炒　官桂去皮不見火剉　貝母去心剉　乾地黃洗焙乾剉　防風去蘆剉　糯米甘草剉炒　大麻仁去殼　大豆卷黑豆芽是不乾曬之　黃芩剉　各二分　石膏明淨硬者　麒麟竭　沒藥去石　龍腦各一錢半

右件藥並須用州土上等好者擣爲細末以熟蜜六兩入水一分同煉令水盡和藥了卻入臼內杵五百下取出平分七十二圓每服一圓產前產後血風頭旋身戰薄荷酒下月信不通當歸酒下赤白帶下溫酒下臨產難產胎衣不下子死腹中橫產倒生死絕不語但看心頭熱氣在取一圓京棗湯化開

灌入喉中立甦。產後惡血不盡。臍腹疼痛。嘔吐、發熱、增寒、煩悶。月候不調。或多或少。皮膚虛腫。惡露不止。虛勞中風。口噤不語。半身不遂。產前產後赤白痢。大便祕澁。血渴血暈。狂語見鬼。頭痛。面色痿黃。漸成勞瘦。飲食無味。並用溫酒研下。催生當歸酒下。產後中風血暈。生地黃汁同煎十沸。研藥灌口中。禦風。但五日一服。空心熱酒嚼下。浴後溫酒嚼下。中風不語。身急如板。用消梨穰薄荷同研藥灌口中。候汗出了。相次揭衣被。當風坐臥立瘥。其餘一切諸疾。並用當歸薄荷酒研下。清酒亦得。小兒天弔驚風。用藥一圓。分作三服。薄荷酒下。

◉五積散 臨產時服。助氣催生。

蒼朮二十兩。去蘆。桔梗十兩。去蘆。陳橘皮六兩。去穰。白芷去苗。甘草炙。各三兩。當歸二兩。去蘆須。洗、切、焙。芎一兩半。洗、剉。芍藥白者。剉。去皮。半夏湯洗。各一兩。麻黃春夏二兩。秋冬三兩。枳殼四兩。鼓炒去穰。肉桂春夏三兩。秋冬四兩。別杵。薑炙。厚朴二兩。別杵。乾薑春夏一兩半。秋冬二兩。

右十五味爲麤末。分作六分。大鍋內煖火炒令微赤。香熟卽止。不可過焦。取出以淨紙藉上攤令冷。入枳殼、肉桂、厚朴三物和之。若產婦難產。經三兩日不生。胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澁。用藥末二錢。加順元散一錢。水七分。酒三分。煎至七分。相繼兩服。氣血內和。卽產。胎死者不過三服。當下。其順元散亦須量產婦虛實用之。

◉又方

只用五積散二錢。入附子末一錢。水一盞。同煎至七分。無順元散則用此。

◉順元散

烏頭二兩（炮烈。切片。）　附子（炮去皮臍。切片。）　天南星（炮。）　各一兩。　木香半兩。（懷乾。剉。）

右爲末。入前五積散同煎服。

◉催生神効聖功散。（此藥極滑胎易生。其藥煎出。婦人多不愛喫。切須令強服。催生累得効。）

榆白皮（取深大根。刮去赤皮。取粉紅色者。去心薄切。焙乾。秤。）　滑石各一兩。　沒藥半錢。（研。）　當歸一分。（去蘆。洗、切。）　朱砂半錢。（別研。）

右件爲細末。次入朱砂。再研和勻。每服二大錢。水七分。盞煎三兩沸。及九箇月以來方可服。如臨產覺陣痛。亦依前服。自服此藥。忌登高廁。

◉催生安胎救命散

烏藥四兩。（別以醋炒黃色。）　前胡半兩。（揀洗、切、焙。）　菊花一兩。（去梗。）　蓬莪茂二兩。（炮。乘熱鏨碎。）　當歸半兩。（去蘆須。）

右剉碎。用好米醋炒乾爲度。同爲末。如死胎在腹。用炒薑豆淋酒調藥三錢。連進三服。立下。死血衝心。炒薑豆淋酒下二錢。入童子小便半盞。安胎用熱酒下一錢。血山崩熱酒下一錢。產後一切血疾皆可服。尋常催生用炒薑豆淋酒調三錢。只一兩服立生。藥須用新磁罐收。勿令失氣味。

◉神効催生丹

臘月兔腦髓一枚。麝一錢。別研。乳香末一分。須黃明者。乳鉢內研細末。外以冷水浸鉢。輕研。母丁香一錢。爲末。須辛辣如荔支核大者佳。不可用陳者。

右一處研細。用兔腦髓爲圓。如○此大。慢火焙乾。磁合收封。糊合口。不要出氣。候產婦陣痛頻。以温丁香湯吞下一圓。產婦不痛。其子順生。男左女右手把藥出。急洗藥焙令乾。凡一粒可用三次。合時勿令鷄、犬、婦人、孝子見。服時婦人閉目取藥。產婦閉目吞之。神効。

◉催生如聖圓

乳香好明淨者。研如粉。

右以生猪心血和圓。如梧桐子大。覺腹痛時。濃煎茅香湯下三十圓。嚼破服。端午日合。切忌婦人、鷄、犬見。橫倒生只一服。此方絕妙。

產後諸方

◉勝金湯才產了便服。去惡血。止血暈。

地黃汁二分。生。生薑汁一分。生。

右用童子小便一分。同煎十餘沸。温服。地黃、生薑須是淨潔沙盆內研取自然汁。切不可犯生水。

◉又方治血暈至急。

生地黃三兩切碎　生薑三兩切碎不去皮

右二物相和同炒乾碾爲末每服二錢研木香酒一盞同煎三兩沸通口服壓下血立愈

◉又方產後血暈欲死及餘血不盡被風吹卽變成寒熱

生地黃四兩　生薑四兩

右並薄切新瓦乾之爲細末溫酒調下二錢此二方俱妙

◉漬小便方小便難喫此法漬之用

烏梅五個湯內洗淨　炙了甘草末二錢　炮了乾薑末一錢

右三味先於椀內用沸湯少許浸少時候烏梅軟卽以熱小便一盞許就椀內浸令產婦閉氣作一服服之如欲再服卽別用烏梅等一依前法重浸方可服不可更用浸了藥也若產婦才分娩了卽須以童子小便依尋常與之未可用此法第二次方可用此法

◉燒鹽法初食鹽用此法燒之

好淨鹽不拘多少

右以翦葉裹作粽子樣於炭火內燒候鹽通紅如火卽取出放淨地上一伏時候火氣盡研用

◉百草霜散產後血暈可服

百草霜一錢秤卽鍋底上黑煤也　生薑二錢秤去皮切炒乾　薑黃半錢

右爲末。以生地黃煮濃汁調下二錢。

◉又方

劉寄奴一握。剉。　甘草半兩。炙、剉。

右以水一椀半煎七分。去滓服。才覺血暈。喫一服。甚者再服。無事。覺腹痛。卽先煎下。恐緩急煎不成也。

◉黑散子　治療見產後諸證用藥門。

琥珀別研細。朱砂別研。京墨煅通赤。放冷用。血苗灰卽鯉魚鱗灰也。新羅白附子炮烈。百草霜乃鍋底上黑煤也。黑衣卽鼈額上煤也。倒掛者亦得。又謂之烏龍尾。鼈黃灰亦得。各半兩。麝別研極細。白殭蠶剉、炒去絲嘴。川當歸洗去蘆須。切、焙。各一分。

右爲末。每服二錢。炒薑温酒調下。

◉烏金散　產後血暈。或惡露不盡。死胎不下。並可服。

大豆　生薑各四兩。蓬莪茂剉。當歸去蘆須。洗、切、焙。黃連去須。各一兩。椶皮二兩。

右先下生薑、大豆。炒候薑乾。卽下當歸、茂、黃連。炒看豆紫色透心。卽以椶皮點火。入藥銚中。椶皮盡成黑灰。卽傾地上。以紙襯出火毒。爲末。每服二錢。童子小便調下。產後雖無事。服之亦佳。

◉金黃散　產後惡血攻心。發燥。可服。

蒲黃半兩。隔紙炒。　延胡索一兩。剉。　桂心一分。不見火。

右爲細末。每服一錢。用烏梅湯放冷調下。

◉麒麟竭散　產後惡血攻心、漸次暈悶、可速服。

麒麟竭一兩。爲末。　生薑半兩。切碎。

右用酒一盞。同煎至八分。去滓。帶熱通口分兩服。立驗。

◉千金散　產後惡物不下、或不盡、腹痛、可服。

桂心去皮、不見火、剉。　蔵靈仙鐵脚者、去根、剉。　白芷去蘆、剉。　當歸去蘆須、洗、切、焙。　牡丹皮剉。　各一兩。

右同杵爲細末。每服二錢。煎神麴湯調下。

◉地黃散　產後惡物不盡、腹痛、可服。

熟乾地黃一兩。略炒。　生薑四兩。細切如蠅頭大、於銀器、或銅器、或新瓦上、炒令黑焦煙起爲度、半兩。　當歸一兩。洗去蘆須、切、焙。

右同杵爲細末。每服一大錢。用生薑炒湯調下。

◉牡礪散　產後惡露不絕、可服。

牡礪半兩。燒。　龜甲半兩。用好醋炙黃。

右爲細末。每服温酒調下二錢。食後服。

◉桃仁散　產後心腹痛、可服。

桃仁二錢。去皮尖并雙仁、炒黃、秤。　蓬莪茂一錢半。秤、用慢火炮、取出、乘熱擣碎。　桂心二錢。剉、不見火。　當歸四錢。去蘆須、剉、焙、秤用。

右爲細末熱酒調下一錢如不喫酒只用水一中盞藥末二錢煎七分帶熱服

◉川芎散（產後心腹痛可服）

川芎（洗、剉）　桂心（不見火、剉）　木香（剉、慢乾）　當歸（去蘆須、洗、剉、焙）　桃仁（去皮尖幷雙仁、炒黃）　各一兩

右爲細末每服一錢熱酒調下如不欲飲酒卽用水一盞藥末二錢煎至七分帶熱服不拘時候

◉金花散（產後血暈一切腹脇疼痛不以虛實可服）

薑黃（片子者剉）　熟乾地黃（炒）　各二兩　肉桂（去麤皮不見火）　牛膝（去根酒浸一宿剉碎焙乾用）　劉寄奴（剉勿用色黑者）　各一兩

右爲細末每服二錢如疾勢輕者卽以水或酒用一盞煎至七分和滓温服重急者以豆淋酒同煎服

◉當歸散（產後痢可服）

當歸（去蘆須洗、切、焙）　一分

右爲細末每服二錢米飲調下未止再服

◉人參散（產後虛汗發熱可服）

人參（切去蘆作片子焙）　當歸（淨洗去蘆切、焙）　各半兩

右分作兩服每用猪石子一隻切作八片以灰去血水用水二盞棗二莖粳米一合生薑三片煎一盞去石子等温服早晚各一服

◉四神散產後血氣心腹痛．可服．

當歸去蘆須．剉、洗、焙乾用．　芍藥白者．剉．　川芎剉．　各一兩．　乾薑半兩炮烈．剉．

右爲細末每服二錢熱酒調下．

◉香桂散產後臍下疼痛不止．可服．

當歸去蘆須．洗、焙．　川芎剉．　各一分．　官桂半兩去皮．不見火．剉．

右爲末分作三服每服酒一盞煎三五沸更入小便少許同煎至七分溫服甚者再服必効如不欲入酒卽以水代之．

◉當歸散婦人產後血氣、血刺、血暈、血崩．惡露不止或虛、或腫、或見神鬼、或如中風、或瀉、或痢、或如瘧疾者．其功効如神．兼治產後一十八病．唯瀉或喘．本方不治．

當歸去蘆須．洗．焙．　芍藥白者．剉．　乾薑炮烈．剉．　乾地黃湯洗．焙乾．剉．　肉桂去麤皮．不見火．　蒲黃隔紙上炒．　甘草炙．剉．　各一兩．　黑豆二兩炒熟．去皮．

右爲細末溫酒調下二錢日進三服不拘時候甚者三服愈常服日兩服或一服．

◉柿湯產後嘔逆氣亂心煩．可服．

乾柿一箇切碎．水一大盞煮熟熱呷甚妙．溫卽再煖令熱呷喫．

◉荆芥散治產後一切雜治之疾．

荆芥不以多少．

右爲細末每服一錢或二錢温酒調下立効有急疾及風候宜速爲之此方絶妙家中常用之產婦雖無病每日進一服只用童子小便調下有急疾用小便酒各半調之尤佳

◉陳梅散（產後痢可服）

多年白梅不以多少

右燒成灰存性研爲細末陳米飲調下一大錢甚妙

難產諸方

◉治產難子死腹中又妊兩兒一生腹中一死腹中死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪一升約五兩　甘草四兩（炙、剉）　阿膠三兩（用始粉炒）

右以東流水一斗先煑二味至三升卽內膠膠烊頓服之不能一頓服者食頃再服若至困灌之卽活作東向竈葦薪煑之（此方與前蟹爪湯相犯唯不用桂心）

◉治難產

榆白皮一升（切）　瞿麥（揀淨）　木通（剉）　各三分　牛膝（去苗根酒浸一宿剉焙乾用）　大麻仁（去殼）　各一兩

右爲麤散每服四錢水一中盞煎至六分去滓温服頻服佳

◉又方

當歸二兩（去蘆須洗切焙）　芎一兩（剉）

右爲麤散每服四錢水酒各半中盞煎至六分去滓温服頻服佳若慮胎在腹已死者服此藥胎死即下胎活即安神効

◉又方

赤小豆一合略炒　黃明膠一兩剉

右以水一盞煮豆令熟去滓內膠令消温温頓服

◉又方

取馬嚼一枚覺痛即令產婦左手把之甚効

◉又方

取東引槐枝手執之

◉又方

取桃仁分破書一片作可字一片作出字依前還合令母吞之即產此天眞法也神効

◉又方

子母草生　子母草挼

右收五方氣飲氣書二道用茅香湯吞之

◉又方

取葶藶子四粒去殼水研取汁少許塗產婦脚心中才產便洗卻并貼臍中亦良

◉又方

取皂角末少許吹母鼻中令噓其子便下

◉又方

取大豆一顆擘破書其夫姓名於上以酒吞之

◉又方

雄虵蛻一條大者以頭按產婦臍中自腰後左繞轉卻以尾按臍中才匝便下此法極驗虵蛻在高處者爲雄在地者爲雌須頭尾全者

逆產諸方

◉治逆產

半夏湯洗七遍去滑焙乾 白斂各一兩

右爲細末每服二錢生薑酒調下難產一服橫產二服倒產三服兒死四服若胎衣不下母氣欲絕亦宜服之每一服如人行一里再進加瞿麥二兩尤妙小產只一服愈

◉又方

急以鹽和輕粉塗子脚底又急以小針刺子脚底卽轉覺痛驚掣入卽順出

◉又方

以鹽摩母腹即順出。

◉又方

當歸不以多少。微炒。去蘆須。洗、剉、焙。

右爲細末。溫酒調下二錢。

◉又方

艾葉一兩。炒。

右以酒一大盞。煎至六分。去滓。分作兩次溫服。立效。水煮亦得。

◉又方

車前子不以多少。

右爲細末。溫酒調下二錢。

◉又方

菟絲子不以多少。

右爲細末。溫酒調下一錢。

◉又方

以手中指取釜下墨。炙畢子足。卽順生。

橫產諸方

葵子二合。　黃明膠剉。　滑石末各一兩。

右爲細末。以水一大盞半。煎至一盞。去滓。分作三服。溫服。

◉又方 逆產、橫產、難產、胎瘦、姙娠產前後虛損、月候不調、崩中、皆可服。

百草霜。　香白芷各一兩。

右件爲細末。每服二錢。童子小便一茶脚許。調勻。以沸湯四五分化開服。止一服。甚者再服愈。

◉又方 橫產、逆產、胎死腹中、及胎衣不出、母欲絕、皆可服。

半夏 熱湯浸洗七遍、去滑、焙乾。　白歛剉碎。　瞿麥頭子各半兩。

右爲細末。每服二錢。炒生薑酒調下。

◉又方

瞿麥一兩。

右以水一大盞。煎至六分。去滓。分作兩服。溫服。

◉又方

牛尿不以多少。

右塗母腹上。卽順出。

◉又方

虵蛻皮不以多少。

右用炭火燒作灰。研令極細。温酒下二錢。若子死腹中。服之立下。

胎衣不下諸方

◉産婦臨産。先脫常着衣裳一件。覆竈頭。卽無胎衣不下之厄。此法極驗。不可不信也。

◉治胎衣不下

大牛膝一兩。去苗。　葵子一合。

右搗碎。以水一大盞。煎至半盞。去滓兩服。温服。

◉又方

繫膏帛燒灰。酒半升調下。

◉又方

飲洗兒水一口立下。

◉又方

萆麻子三粒。　鼠粘子一分。卽牛蒡子。

右爲細末若子死腹中無藥可下卽以醋糊調藥塗在口上以紙貼之立下

◉又方

當歸一兩洗去蘆須切焙乾　瞿麥揀淨　芎藭洗剉　各三分

右爲麤散以水及米醋各一中盞煎至一盞分作三服溫服

◉又方

當歸洗後蘆須切焙乾　鼈甲酥塗炙令黃　各三分

右爲細末先取產多婦人髮半兩燒爲灰細研入當歸末以水一大盞半煎取八分然後下盡鼈甲末煎五七沸分爲三服若數日不產子死腹中者皆可服服後如人行四五里再服

◉又方

水銀一彈子大

右斡開產婦口灌之扶起令坐不定頁扶起令倚立其子卽下唯臨產面靑舌赤沫出欲死子猶不出幷產婦已死而欲令子出者可服

◉治產前產後痢疾

虼蛂端午日收窖乾

右產前痢用前兩脚產後痢用後兩脚燒灰存性爲末米飮調下食前服此藥家中累曾經驗神效

許學士產科方　名叔微字知可。

◉滑胎枳殼散

商州枳殼二兩去穰劉作小塊麩炒　甘草一兩炙劉

右爲末每服二錢百沸湯點服空心食前日三服凡懷孕六七月以上即服令兒易生初生胎小微黑百日以後肉漸變白此雖孫眞人滑胎易產方然抑陽降氣爲衆方之冠

◉內補圓治姙娠衝任脈虛補血安胎

熟乾地黃二兩劉焙當歸一兩去蘆須洗焙乾

右細末煉蜜和圓如桐子大每服三四十圓溫酒下無時

上三方諸集皆載之在人用之如何爾大率婦人姙娠唯在抑陽助陰素問云陰搏陽別爲之有子蓋關前爲陽關後爲陰尺中之脈按之搏手而不絕者姙子也婦人平居陽氣微盛無害及其姙子則方閉經隧以養胎若陽盛搏之則經脈妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡羣隊若陰陽交雜別生它病唯是枳殼散所以抑陽四物湯所以助陰故爾枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補圓佐之則陽不至強陰不至弱陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及也

◉木香圓治婦人有孕傷食

木香二錢。剉。　京三稜（慢火煨。乘熱剉作片子。）　人參（去蘆。切片。焙。）　白茯苓各三錢。

右細末。麵糊圓棗豆大。每服三十圓。熟水下。

◉白朮散。治妊娠氣不和。調飲食。

白朮（切作片子。焙乾。）　乾紫蘇各一兩。　白芷（微炒。）　人參（去蘆。）各三分。　川芎（洗、剉。）　訶子皮（去青皮。）各半兩。　甘草一分。（炙、剉。）

右細末。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。不拘時。溫服之。

經云。飲食自倍。腸胃乃傷。又云。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。若妊子飲食不節。生冷毒物。恣性食噉。致脾胃之疾。故妊娠傷食難得藥。唯此二方最穩。

◉紫蘇飲。治妊娠胎氣不和。懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨產驚恐氣結。連日不下。

紫蘇莖葉一兩。　大腹皮（剪碎。）　人參（去蘆。切片。）　川芎（剉開。）　陳橘皮（去白。）　白芍藥各半兩。　當歸（去蘆須。切。）三分。　甘草一分。（炙。）

右細剉。分作三服。每服用水一盞半。生薑四片。葱白七寸。煎至七分。去滓。空心服之。

曾有婦人累日產不下。服遍催生藥不驗。予曰。此必坐草太早。心懷下一口氣。結而然。非順不順也。素問云。恐則氣下。蓋恐則精卻。卻則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行矣。得此藥一服便產。及婦人六七月子懸者。予用此數數有驗。不拾服。胎便近下也。

◉下死胎方

桂末二錢、麝香當門子一個、同研、煖酒服、須臾、如手推下、比之用水銀等、此藥不損血氣、

◉琥珀散、治婦人月經壅滯、每發心腹臍疔痛不可忍、及治產後惡露不快、血上愴心、迷悶不省、氣絕欲死、

荊三稜　蓬莪茂　赤芍藥　劉寄奴　牡丹皮　官桂（削去皮、不見火、合磨爲末、後入、）　熟乾地黃（剉、焙、）　菊花（揀去枝梗、）　眞蒲黃　當歸（去蘆頭、焙乾、秤、）　各一兩、

右前五味、用烏豆一升、生薑半斤切片、米醋四升、同煮豆爛爲度、焙乾、入後五味同爲末、每服二錢、温酒調下、空心食前服、一方不用菊花、蒲黃、用烏藥、玄胡索亦佳、予家之祕方也、若是尋常血氣痛、只一服、產後血衝心、二服便下、常服尤佳、予前後救人急切不少、此藥易合、宜多合以救人、

◉佛手散、治婦人妊孕五七月、因事築磕著胎、或子死腹中、惡露下、疼痛不已、口噤欲絕、用此藥探之、若不損則痛止、子母俱安、若胎損立便逐下、此藥催生神妙、

當歸六兩、（洗去蘆、切片、焙、）　川芎四兩、（剉、略炒、）

右麤末、每服三錢、水一小盞、煎候相次欲乾、投酒一大盞、止一沸、去滓温服、口噤灌之、如人行五七里再進、不過三兩服便生、有一方云、此藥治傷胎去血多、崩中去血多、金瘡去血多、拔齒去血多、昏暈欲倒者、水煎服、

◉愈風散。治產後中風口噤。牙關緊急。手足瘈瘲。

荊芥穗輕焙過一兩。

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。

經驗產寶皆有之。陳選方中用舉卿古拜二味。蓋切脚隱語以祕之也。此藥委有奇效。神聖之功。大抵產室但無風爲佳。不可衣被帳褥太暖。太暖卽汗出。汗出則腠理開。易於中風。便昏冒。記有一婦人產後遮護太密。閤內更生火。睡久及醒。則昏昏如醉。不省人事。其家驚惶。醫用此藥佐以交加散。祝云。服之必睡。睡中必以左手搔頭。覺必醒。果如其言。

◉交加散。治婦人榮衞不通。經脈不調。腹中撮痛。氣多血少。結聚爲瘕。產後中風。

生地黃五兩。研取汁。　生薑五兩。研取汁。

右交互用汁浸滓一夕。各炒黃。漬汁盡爲度。末之。尋常腹痛。酒調下三錢。產後尤不可闕。

◉蒲黃散。治產後出血太多。虛煩發渴。

眞蒲黃末。每用二錢。以水調飲下。渴躁甚者。新汲水調下。

◉護胎方。治妊娠時氣身大熱。令子不落。

伏龍肝爲末。水調塗臍下二寸。乾則易。瘥卽止。又取井中泥塗心下。乾則易。

◉又方

浮萍乾者．川朴消　蛤粉　大黃剉碎．微炒．　藍根各一兩．剉碎．

右爲末．水調封臍上．安胎解煩熱．

◉麻仁蘇子粥．治婦人產後有三種疾．鬱冒則多汗．汗則大便祕．故難於用藥．唯此粥最佳且穩．

麻仁蘇子各一兩．研細．

右以水二盞．煮作粥．空心食之．

◉鹿屑湯．治妊娠熱病．胎死腹中．

鹿角屑一兩　一碗．葱白五莖．豆豉半合．同煎至六分．去滓．溫分二服．極妙．

◉治婦人生產數日而下．及胞衣、死胎不下者方．

用莖麻七粒．去殼．研如泥．塗足心．纔下．便急洗去．此崔元亮海上方．人但未知爾．政和中．一鄉人內子產二日不下．予令謾試之．一塗俄頃便下．自後常用極驗．

衞生家寶產科備要卷第七

胎孕方

◉人參白朮散治婦人經候不來身如病而無病脈滑大而六部俱勻必有孕也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作他疾治之

白朮一兩去蘆切焙人參半兩去蘆切焙丁香油煮剉碎慢乾甘草炙剉各一分

右爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎七分盞去滓溫服食前嘗驗之淸晨意味佳自午後漸惡者是有孕無疑也

◉千金半夏茯苓湯治妊娠惡阻病其證心中憤悶虛煩吐噦惡聞食氣頭眩四肢百節煩疼沉重多臥少起惡寒汗出疲極瘦悴

半夏湯泡七遍茯苓去皮剉碎熟乾地黃水略洗剉碎慢火焙乾各一兩二錢橘皮去白細辛去葉人參去蘆切片白芍藥剉旋覆花揀淨葦窮洗剉桔梗去蘆剉甘草炙剉各八錢

右十一味爲麤末每服四大錢水一盞半生薑五片煎至七分盞去滓微熱服方有氣病加減及相繼合服茯苓圓並見千金本方

◉枳殼散妊娠至五月以後能順氣瘦胎易產

枳殼八兩去穰麩炒秤甘草四兩炙秤剉碎

右爲細末。湯點二錢。空心晚食前。日兩服。入月三服。

◉蹉跌遌水酒散。能治妊娠百疾。安養胎氣。自五六個月以後。常服至產時。草蓐之間。痛當減半。

當歸洗去蘆須切片焙　槐角擇淨炒香　枳殼去穰麩炒　川芎洗剉　貝母去心薑汁製一宿焙乾

右五味等分。爲細末。每服二錢。水酒各半盞。同煎至七分。盞。食空時服。臨月日進兩三服。

◉檳榔散。治妊娠常若胸腹脹滿。兩脇妨悶。飲食不下。四肢無力。頻服能滑胎益氣。

檳榔剉碎　赤茯苓去皮剉　前胡去蘆各一兩　人參去蘆切片子焙　白朮去蘆切片子焙　芎各半兩　陳皮去白　枳殼去穰麩炒各三分　甘草一分炙剉

右九味爲細末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗子二個。煎至七分。盞。溫服。日兩服。

◉治胎不穩。坐臥不得安方。

木賊去節剉　川芎洗剉

右二味等分。爲細末。每服四錢。水一盞。入金銀同煎至六分。盞。去滓。空腹溫服。日三服取效。

◉治妊娠偶因所觸。或墜高傷打。致胎動不安。腹中痛不可忍方。

縮砂不以多少。熨斗中。熳火炒令熱透。去皮取仁。

右爲細末。每服二錢。熱酒調下。須臾腹中胎動處。覺極熱。卽胎已安。

◉治胎動。若胎已死。卽下。未死。卽安。及治血下心腹滿者。如湯沃雪方。卽用聖功川芎湯用大劑。酒水各

半煎連三服取效本方在後。

◉千金蟹爪湯治妊娠閃撲、僵仆、失據、胎動轉上搶心、甚者血從口出、逆不得息、或注下血一斛、胎死不出、母氣欲絕、服此母卽安、血亦止、當產者立下、未產者胎再安。

蟹爪半盞（以多爲佳）　甘草（炙、剉）　桂（去皮、剉、不見火）　各一兩　阿膠一兩（剉碎、用蚌粉炒炮、起篩、去蚌粉用）

右以東流水十盞、煮前三味至五盞、去滓、入阿膠再煮至膠烊盡、頓服爲佳、不能者分減服、一時辰間取盡劑、已不能飲者、斡開口灌之。

◉又方治胎動及難產、子死腹中、若妊二子、一子已死、一子尙生、服之能令死者出、生者安、與前千金蟹爪湯方同、唯不用桂耳。

◉葱白湯治妊娠傷寒、頭疼、發熱、不可同常法治之、用此藥最穩。

大葱白十莖（去青連鬚用、或小者加至二三十莖、切碎）　生薑二兩（切碎）

右用水二椀、煮至一椀、去滓、分二三服熱服之、取效快。

◉白朮散治妊娠傷寒。

白朮（去蘆、切片子、焙）　黃芩（剉碎）

右等分、剉、用新瓦上炒香爲細末、每服三錢、水一盞、生薑三片、棗子一枚、同煎至六分、盞熱服、唯四肢逆冷、陰證見者、未可服。

◉治妊娠傷寒大熱甚胎不安者方

阿膠一兩洗、剉碎、以蛤粉末同炒泡、起篩、去粉、候冷入磁、

右爲細末每服二錢竹瀝調下卒無竹瀝用小麥、竹葉同煎湯調亦可

◉治妊娠傷寒大熱令胎不落方

竈底黃土爲末

右用新水調塗臍下周迴五六寸乾卽復塗頻頻爲之熱退乃止方或用酒及泔清調皆可

◉治妊娠小便卒不通方

裹茶葛葉一兩燒灰、研、　滑石半兩研細、

右同研勻每服一二錢用臘茶清調入生油二三點服只沸湯調亦得

◉又方

赤連珠甘遂

右爲末每服一字至半錢湯調下如喫了藥且不得服有甘草藥半日或一日緣二藥相反故也

產前方

◉榆皮滑胎散妊娠入月宜服之多往往坐蓐不覺胎下如未入月不可先服

榆白皮二兩切、焙、

右爲細末每服二錢煎糯米飲調下空心食前服

◉墨神散催生及治橫逆生服之卽順

百草霜

右爲細末每服二錢用米醋童子小便各少許調成稀膏沸湯浸至六分盞溫服

◉催生桂散有三五日不能產者只一服再服神驗

官桂去皮麁不得見火

右爲細末每服二平錢沸湯或童子小便調下

◉治難產或橫倒生或胎死不出母氣欲絕方

半夏湯泡七遍焙乾　白歛

右等分爲細末每服二錢酒調下不能酒者湯調小難一服橫生二服倒生三服胎死四服加瞿麥一倍尤良

◉又方治應于難產胎衣不下只三服

以蛇皮燒過或以銚子炒微黑

右研細入麝香少許用熟湯調通口服之每服一錢

◉又方

車前子不以多少。

右爲細末。用熟湯或小便調服二錢。

◉又方

雲母粉半兩。

右以酒調二錢。卽產。不順者卽順下。

◉易產方

當歸一兩半。去蘆須。切片、焙。　桑寄生半兩。揀淨。　川芎一兩。剉碎。

右爲麤末。每服四錢。水酒各半盞。煎至六分。去滓。通口服。不計時。

◉小琥珀散。安胎氣。調血脈。應是產前產後血氣諸疾。俱能療治。神效。

川芎六兩。揀顆顆如豌豆者。生剉。　川當歸去尖梢蘆頭淨四兩。好酒浸一宿。慢火炙令黃色。不得焦。候冷切細。　桑寄生二兩。

右焙乾。搗羅爲末。每服二錢。水八分盞。煎至六分。卻入好酒二分。更煎三兩沸。溫服。孕婦臨月空心一服。至臥蓐時。胎滑易生。惡物亦少。新血便生。臟腑自然不痛。

◉下死胎方

朴消一兩。

右爲末。每服二錢。溫童子小便調下。嘗因產試之極驗。

◉下鬼胎方。婦人稱孕。坐產乃不下。有經三五日者。乃鬼胎也。

蜀椒二兩。去目。微炒。　葱二握　桃頭枝十四枚

右用水一斗。煮熟。乘熱傾盆器中。令婦人坐上薰蒸之。當自散。

◉治草蓐或產後血暈悶絕。兼治魘死、卒死、溺死、縊死等。謂之五絕。卒中風牙關緊。氣不通。用之亦驗。

生半夏一兩。

右爲細末。用一豆許。蘆管吹入鼻竅中。卽甦。

產後方

◉牛膝湯。治胞衣不出。令胞自爛。

牛膝酒浸一宿。切碎。焙乾。　瞿麥剉。　各一兩　滑石二兩。搥碎。　當歸三分。去蘆須。切片。焙。　通草一兩

半切。　葵子二合半

右六味。用水九盞。煎取三盞。分作三四服。

◉當歸建中湯。治產後虛羸不足。腹中疗痛。呼吸短氣。或小腹拘急痛。引腰背。不能飲食。凡產後一月內。服三四劑爲善。令人丁壯。古方云。產前安胎四物湯。產後補益建中湯者。謂此也。

當歸二兩。剉去蘆。　官桂一兩半。削去皮。秤。　白芍藥三兩　甘草一兩。炙。

右爲麤末。每服四錢。水一盞半。生薑五片。棗二個。同煎七分。盞去滓。入餳少許。再煎微熱服。空心食前

日三服。如喜嘔人不用入餳。

◉聖功川芎湯。治產後血虛迷悶。旋暈耳鳴。不省人事。胸膈不快。惡心嘔噦。化惡血。生好血。尤治血崩、血噤。亦治頭疼發熱如傷寒證者。治病甚多。此產家之要藥也。

大芎半兩　當歸一分。去蘆。

右二味細剉。作一劑。用水一盞半。好酒一盞。同煎至一盞半。分二服。如新產血未定。及平常飲酒少人。但只用水二盞煎兩個六分盞。卻將童子小便添成二個八分盞服之。

◉琥珀黑神散。治產婦十八惡證。凡臨產宜進一二服。能安神順胎。產後雖無疾。七日內亦日進一二服。能去諸疾。壓驚。若偶被驚恐或變證。當連服取效。

琥珀別研如麵細　辰砂別研　各二錢　麝香別研　好黑燒過研　白殭蠶炒　各一錢　當歸末　鯉魚鱗灰　百草霜　白附子末　黑衣即頭上到卦黑處無即以窗衣燒灰代　各三錢

右十味研勻。每服二平錢。炒生薑酒和童子小便調湯。盪溫服。如產後崩中。狀似雞肝。寒熱閉悶。或產後四肢浮腫及寒熱。當先服此散。次服通宜圓。

◉通宜圓

巴豆一十五粒。去心膜。生絹袋盛於醯灰汁中。煮十沸。取出。用紙厚裹。壓於重物下出油。研成霜。卻取黑神散三錢匕。無灰酒調成稀膏。入甕器中。於鐺內重湯煮令稠。入巴豆霜和令可圓。

右圓如棕豆大。每服五圓。熟水下。有村婦用墮藥落胎不能下。子纏於腹中臍穿。時出小骨。病極。朱子東途用此圓下枯骨一具而愈。此圓頗難用。須審之。

◉八味黑神散。治產後百疾。唯瀉而加喘者。本方不治。凡產後雖無疾。日進二服。能調血順氣。去諸疾。服七日止。

當歸去蘆頭。酒浸。焙乾。　白芍藥剉。　乾薑炮裂。　桂去皮、不見火。剉。　熟乾地黃剉、焙。　蒲黃紙襯銚、炒香用。　甘草炙、剉。各半兩。　黑豆一兩。炒。

右爲細末。每服二錢。溫酒、米飲。童子小便。任意調服之。

◉烏金散。治產後胞衣不下。或惡露不快。敗血衝心。血運狂語。不省人事。心煩躁渴。臍腹疼痛。嘔吐、發熱。增寒腫滿。或攻皮膚刺痛。凡產後半月內。雖無疾。宜日服之。有疾加進。

黑豆四兩。淨擇。　黃連半兩。去須。剉碎。　生薑四兩。切作錢子。　當歸去蘆頭。露切。　蓬莪茂剉。各一兩。　櫻皮二兩。撕開。

右先下生薑、黑豆炒。直候薑將乾。次下黃連、當歸同炒。更候豆心透紫色。卽以櫻皮點火。入藥鎗中與所炒藥同燃。至櫻皮成燼。卽傾淨地上。盆覆之。少頃。取爲細末。每服二錢。童子小便調下。

◉劉寄奴飲。治產後惡露不快。敗血上攻。心胸煩躁。大渴悶亂。眼黑旋運。或見鬼神。臍腹疼痛。嘔噦惡心。不進飲食。

劉寄奴二兩。擇去梗草。秤。　當歸一兩。去蘆頭。切、焙。　甘草二錢。炙、剉。

右爲麄末。每服二錢。水一盞半。生薑七片。煎至七分。盞去滓熱服。凡治血暈藥。須乘閑煎下。以備急用。

◉當歸一味散。治產後諸疾。調養血氣。（王子亨指迷論。言產後不必服他藥。唯此一散足矣。）

當歸三兩。（去蘆須。切片。焙。）

右爲細末。每服二錢。童子小便或酒調下。日三服。從產下便服之。

◉荊芥一味散。治血噤、中風等疾。取効爲快。無疾服之。能順氣益血清神。

荊芥穗（曬乾。不見火。）

右爲細末。每服二錢。童子小便調下。七日後沸湯調。以當飲茶甚佳。

◉秤槌酒。治產後疾最多。尤治兒枕不散作痛。

鐵秤槌（燒通赤。）

右淬一升醇酒中。候酒再温。可飲飲之。調當歸末服尤効。

◉豆淋紫酒。治產後中風。身痙直。或如角弓反張。

黑豆揀緊小者。淨篩一升。炒令煙出。以好酒三升浸。卽漉出豆不用。

右每服一小盞。能飲者加之。

◉產婦忽患寒熱。如傷寒、時氣狀。切不可用麻黃藥發其汗。以亡津液多故也。宜服四物湯加桂服之。

四物湯方在後。

◉治產後傷寒惡露不行腹脹煩悶欲死方。

朴消生　大黃生

右等分爲細末每服二錢取桃仁去皮尖及雙仁者碎之濃煎湯調下以通爲度樊彥取妻熱病小產後惡露爲熱所搏不行苦腹脹煩悶枯竭舌上如生針刺醫以朴消煎湯令漱口得稍潤用大黃煮醋調服一大錢得通快而愈與此略同

◉傷寒產後惡露爲熱搏不行煩悶脹喘狂言宜服抵當湯及桃仁承氣湯龐安常用之驗指迷論亦云龐論云若服之十病十瘥

◉桂心牡礪湯產後頭疼身體壯熱兼治腹內急痛

桂心一兩半略去皮不見火　牡礪燒通赤　白芍藥剉碎　熟乾地黃切焙　各二兩半　黃芩一兩剉碎

右件剉如麻豆每服抄四五大錢水一盞半煎至七分盞去滓溫服

◉增損柴胡湯治產後虛羸發熱飲食不進少腹脹等疾

柴胡去苗水洗過控乾虵焙　人參去蘆切片　半夏湯泡七遍切片子　甘草炙　白芍藥剉　陳皮去白芍洗剉

右七味等分爲麤末每服四五錢水一盞半生薑五片棗二個煎至七分盞去滓溫服日二三服不拘時

◉人參散治產後虛羸脾胃怯弱四肢無力不思飲食心腹氣脹

人參去蘆、切片焙。　黃耆剉碎、用蜜湯拌銚內慢火炒、次微焙。　草豆蔻略煨、去皮剉。　附子炮、裂、去皮臍、切片子。　厚朴剖去麤皮、薑製一宿、次日取出曬、焙乾。　各半兩　白朮去蘆、切片焙。　當歸洗去蘆須、切片子、焙。　木香剉、懷乾。　川芎洗、剉。　白芍藥剉。　桂去麤皮、不見火。　白茯苓去黑皮、剉。　甘草炙、剉。　各一兩　訶子皮　陳橘皮去白高良薑剉碎、用油少許炒透。　各一分半

右十六味爲麤末每服四錢水一盞生薑五片棗子二枚煎至六分盞去滓溫服

◉治產後惡露不絕

牡礪煆通赤　龜甲好醋浸炙黃。

右等分爲細末每服二錢酒調下

◉治產後洞泄不禁下青黑惡物神驗方泄瀉者惡露必不行蓋血滲入大腸爲瀉也分過則愈

荊芥四五穗大者烘乾

右於乾盞中燒存性灰不得犯火入研了麝香一米粒許用沸湯一兩呷調下藥微而能愈大病奇効不可言

◉治產後下痢亦白膿血方

白芍藥剉。　熟乾地黃切、焙。　各二兩　阿膠剉、用始粉末同炒泡起篩去粉。　艾葉揀淨、剉碎。　當歸去蘆須、切片子。

甘草炙、各一兩。

右爲麤末。每服六錢。水二盞。煎至八分盞。去滓。温服。

◉若產後大便頻。腹疼如痢狀者。傷於食也。宜服食藥。感應圓爲佳。他亦可用。產前飲食不著。未久而產。產後亦成痢狀。不必推求產後食飲多少也。

◉治吹妳腫硬。須急用手忍疼毒揉之可散。不爾。當成乳癰。宜服此藥。

皂莢燒存性、研細。　蛤粉

右等分研勻。温酒調下半錢。未散稍加。服藥次仍以手揉之。

◉治吹妳。或兒絕妳後腫痛不可忍方。

栝蔞一個去皮、先取仁研破殼。次同樣剉研。

右以酒漬。同熬數沸。去滓。浸冷酒。和令可飲。隨量飲之。令微醉。睡醒痛當頓除去。

◉萬金散。治妳癰已破。兼治發背、腦疽。

瓜蔞一個去皮、細剉。　生甘草半兩。　沒藥一分研令。

右同研。用酒九盞。石器中熬至三盞。分三服。疾輕者只一服。効。本注云。已救活數百人。

◉通用四物湯。治婦人女子月事。或多或少。或前或後。姙娠腹痛。胎氣不安。產後血塊不散。或亡血過多。或惡露不行。凡婦人之疾。無不主治。本方及加減法如後。

當歸去蘆須、切片、焙、川芎洗、剉、熟乾地黃切、焙、雪白芍藥剉、

右等分爲麤末每服四錢水一盞半煎至八分盞澄取六分淸汁帶熱服平常產乳服至三膞虛弱人服至一月○妊娠下血加艾五七葉阿膠末抄一錢此每服也若疾勢重大小料未効當以四味各半兩細剉不搗以水四盞煎取二盞半去滓分四服一日之中令盡爲度未効再服隨疾加減用藥○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴加栝蔞一兩麥門冬三分○腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分○血崩加地黃蒲黃各一兩○因熱生風加芎一分柴胡去苗半兩○身熱脈燥頭昏項強加柴胡去苗幷黃芩各半兩○祕澁加大黃半兩桃仁一分去皮尖炒、○泄瀉加桂附子一分○嘔加白朮人參各半兩○腹脹加厚朴枳實各一分○發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○煩躁大渴加知母石膏各半兩○水停心下微吐噦加豬苓茯苓防己各一分○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各三分

此活人書加減法也大抵四物湯爲婦女要藥無所不治稍知藥性者皆可隨病加減治血方未有不本此湯因而增損以成者近時名醫有加香附子功用殊勝又有加蓬莪茂官桂各半兩名六合湯治經血凝滯潮熱腹中癖塊疼痛尤快皆以意加之也

◉追命散治婦女血癥積聚疼痛漸致經候隔絕稍失醫治便成勞瘵又治產婦危惡變證胎死上衝悶運欲絕及產後血運他藥所不能救者又治打撲傷損筋斷骨折及破傷風凡此等疾證候危惡醫工縮

手無藥可治此能治之有起死返魂之功雖其人氣已死但心頭尚暖者灌之藥下咽可以再生（先用前半夏吹鼻法然後下藥）神功異効不可具述

半兩錢四五十文多尤佳（乃古文錢中有大小皆可用上作半兩字者錢錢中常有之）火煆通赤淬醯醋中不計次數於醋底淘取淬下碎銅末研之葱礬乳鉢者去之別以水淘澄取如粉者紙上滲乾秤二錢一字（煆錢之法取小爐生炭擁之候通赤以二鐵手鉗用一鉗出火一鉗夾鎖莖腦倒錢入醋中鐵物勿著醋恐坐下鐵屑也再取錢水洗過上鎖莖再煆之如是數次錢色如銀即無可煆矣本方用銅線穿煆入火便斷極費力不可用）巴豆去皮殼心膜秤三錢半（用酸漿水一盞煮至水欲盡焙乾研如泥）大黃錦紋緊實者取八錢煨熟（用小便浸七日每日一換日足濕紙裹薄切焙乾爲末）秤取三錢半

羊脛炭即炭中圓細緊實如羊脛骨者取三四寸卻作十餘段別以着炭同燒通紅淬入醇酒中如是七遍烘乾爲末秤取半兩

右四味合和搗數千杵乾蓋罐子實築臈紙密封收高燥處每一服一字至半錢濃煎當歸酒和小便調下消詳之傷折卽全用酒多飲不妨若產婦血未定及素飲酒少人卽姑少借酒力行藥多以童子小便下之可也此藥累立奇効治者數人皆垂死而復活已折而復續轉以與人所濟又不知數難產悶絕而復蘇者余今妻是也故知此藥爲最審傳者幸勿疑其瞑眩蓋不如此則不足以當奔敗之血且疾勢既危固非平劑之所能愈也服藥後或如霍亂狀勿惟少選當自定下利甚者用前燒荊芥法止之此皆手試而親驗者故併錄以傳（大抵此藥性緊非大危急不可妄服）此藥難成非素備不可得也每遇有妊娠

將產必合一料以備用往往常有餘劑藥成或轉以與親識之喜蓄藥者故此藥所濟爲多陸子正題婦人娩蓐命如垂縷臨時濟急全藉藥石之功方書所載雖已詳備倉猝之際非唯泛濫難於檢尋且莫知其孰爲効驗者妄投一藥則不可復療余得此本皆撮諸家精要之方累試累驗乃廬倅陸子正手抄之書也唯親舊間可以傳之他人不可得而見余雖不欲祕藏而傳本未免訛繆其爲害豈淺耶今重校證庶幾危急之時閱此方如指諸掌也嘉禾寓菴周澂題

衞生家寶產科備要卷第八

形初保育

小兒初生將護法

巢氏病源小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易損傷皆當以故絮著衣莫用新綿也天和暖無風之時令母將抱日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之內重衣溫暖譬如陰地之草木不見風日軟脆不任風寒又當薄衣薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其衣不則令中風寒從秋習之以漸稍寒如此則必耐寒冬月但當著兩薄襦一複裳耳令不忍見其寒適當佳耳愛而暖之適所以害也又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當謹之其飲乳食哺不能無痰癖常當節適乳哺若微不進切當將護之凡不能進乳哺則宜下之如此則終不致寒熱也又小兒始生生氣尚盛無有虛損微惡則須下之所損不足言及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣其冬月下之難將護然有疾者不可不下夏月下之後腹中常當小脹滿故當節哺乳將護之數日間又哺哺之當令多少有常劑兒稍大食哺亦當稍增若減少者此是腹中已有小不調也便當微將藥勿復哺之但當乳之甚者十許日輕者五六日自當如常若都不肯食哺而但飲乳者此是有癖爲疾重要當下之不可不下不下則

致寒熱。或吐而發癇。或致下利。此皆病重不早下之所爲也。則難治。先治其輕時。兒不耗損而病速除矣。小兒所以少病癇者。其母懷娠時時勞役。運動骨血。則氣強胎養盛故也。若侍御多。血氣微。胎養弱。則兒軟脆易傷。故多病癇。兒背須著帽項衣取燥。菊花爲枕。枕之。兒母乳兒三時摸兒項風池。若壯熱者。卽須熨使微汗。微汗不差。便灸兩風池及背第三椎、第五椎、第七椎、第九椎兩邊各二壯。與風池凡爲十壯。一歲兒七壯。兒大者以意節度增壯數。可至三十壯。唯風池特令多。十歲已上可百壯。小兒常須謹護風池。諺云。戒養小兒謹護風池。風池在頸項筋兩轅之邊。有病乃治之。疾微謹不欲妄針灸。亦不用輒吐下。（聖惠乃云。立夏後疾謹不欲妄針灸。亦不欲輒吐下。）所以然者。針灸傷經絡。吐下動腑藏故也。但當以除熱湯浴之。除熱散粉之。除熱赤膏摩之。又以臍中膏塗之。令兒在涼處。勿禁水漿。常以新水洗。新生無疾謹不可逆針灸。逆針灸則忍痛。動其五脈。喜因成癇。河洛間土地多寒。兒喜病痙。其俗生兒三日。喜逆灸以妨之。又灸頰以防噤。有噤者舌下脈急。牙車解急。其土地寒。皆決舌下去血。灸頰以治噤。江東地溫。無此疾。古方既傳有逆針灸之法。今人不詳南北之殊。便按方用之。多害於小兒。是以田舍小兒任自然。皆得無此天。又云。春夏決定不得下小兒。所以爾者。小兒腑藏之氣軟弱。易虛易實。下則下焦必虛。益上焦生熱。熱則增痰。痰則成病。自非當病不可下也。

千金論。生兒宜用其父故衣裹之。生女宜以其母故衣。皆勿用新帛爲善。不可令衣過厚。令兒傷皮膚。害血脈。發雜瘡而黃。兒衣綿帛。特忌厚熱。謹之謹之。

聖惠論凡小兒一歲之內造兒衣裳皆須用故綿及故帛爲之不得以綿衣蓋於頭面冬天可以袷衣蓋頭夏月宜用單衣皆不得著面及乳母口鼻吹著兒顱凡綿衣不得太厚及用新綿令兒壯熱或卽發癇特宜謹之也

聖惠論凡兒匍匐已後逢物卽喫妳母雖至細意必亦不能盡覺春夏必飲滯水冷物至秋初便皆疾作初則多啼不食或好伏地面色靑黃或時腹痛既不解說唯反拗多啼或逢水漿便喫不可制止或睡中驚啼或大便祕澀常人唯知與紅雪鈎藤飲子此二藥終日在口然自不見其效況腹中滯結已多冷熱衝擊頗久二藥何能排去所以得秋氣風吹着背心脚心便成瘧痢庸醫與冷藥則傷滑不禁與澀藥則氣壅不行傷損藏腑益令不食遂使虛熱衝上面黃髮焦滯惡在內手足如火自然風水橫溢四肢便腫如此將養十無一存但每經春夏不問有病無病便須與四味飲子多不三四劑卽康強也

嬰孺論凡兒所以風者衣暖汗出風因而入也

張渙論嬰兒生後兩滿月卽目曈子成能笑識人乳母不得令生人抱之及不令見非常之物百晬任脈生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫半晬尻骨已成乳母當教兒學坐二百日外掌骨成乳母當教兒地上匍匐三百日臏骨成乳母當教兒獨立周晬膝骨已成乳母當教兒行步上件並是定法蓋世之人不能如法存節往往抱兒過時損傷筋骨切宜謹之爲吉

張渙論嬰兒冬月但當着夾衣及衲衣之類極寒卽漸加以舊綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以爲

害也。

張潠論。嬰兒須看稟受南北之殊用藥。蓋地土寒温不同。此古人之最爲謹也。嬰童寶鑑論。孩子春勿覆頂、裹足。致陽氣亡出。故多發熱。衣物夜露。多生天癎。三歲之中勿太飽。勿太飢。臥須覆肚。食須飲水漿。若能如此者。則子少患而無天傷矣。

萬全方論。田舍婦人產育。皆不知小兒初生將護之法。所養有絕無他疾者。譬之凡草、凡木。生於深山、大澤之中。容易合抱。至於奇材異果。縱加培擁。間有不秀實者。此豈貴賤之理有異哉。蓋天之於物。出於自然。古人亦云。小兒始生。肌肉未成。不可暖衣。卽令筋骨緩弱。宜見風日。若都不見風日。卽令肌膚脆軟。便易傷損。皆以絮著衣內。勿用新綿。天氣和暖。無風之時。令乳母抱兒日中嬉戲。數見風日。卽血凝氣剛。肌肉硬密。堪耐風寒。此田舍小兒較之此說尤長。

擇乳母法

千金論。乳母者。其血氣爲乳汁也。五情善惡。悉是血氣所生也。其乳兒者。皆宜謹於喜怒。夫乳母形色所宜。其候甚多。不可求備。但取不胡臭、癭、瘻、氣、嗽、瘕疥、癡癰、白禿、瘧瘍、瀋脣、耳聾、鼽鼻、癲癎。具此等疾者。便可飲兒也。但見其故灸瘢。便知其先疾之源也。

乳兒法

聖惠論。凡爲乳母。皆有節度。如不禁忌。卽令孩子百病並生。如是自曉攝調。可致孩子無疾長壽。是以春

夏切不得衝熱哺孩子。必發熱疳幷嘔逆。秋冬勿以冷乳哺孩子。必令腹脹、羸瘦。乳母嗔怒次不得哺孩子。必患狂邪。乳母醉後不得哺孩子。必患驚癇、天吊、急風等病。乳母有娠不得哺孩子。必患胎黃及脊疳。乳母有疾不得哺孩子。必患癲癇、風病。乳母吐後不得哺孩子。必令嘔逆、羸瘦。乳母傷飽不得哺孩子。必致多熱喘急。

乳母雜忌法

聖惠論。乳母忌食諸豆及醬、熱麵、韭、蒜、蘿蔔等。可與宿煑羊肉、鹿肉、野雞、鴈、鴨、鯽魚、葱、薤、蔓菁、萵苣、菠薐、青麥、苦蓬、冬瓜等食。若兒患疳。即不得食羊肉及魚。又不得油膩手拗裹及抱兒。又不得以火炙襁褓熱時。便與兒著。令孩子染熱病。始終須謹。大抵冬中切宜戒之。若天大寒。以火炙衣被。且拋向地上良久熱挼之。冷暖得所。即與孩子裯之。無妨。如乳母有夫。不能謹卓者。切須防備。儻新有過犯。氣息未定。便即乳兒者。必能殺兒。未滿月內所驅使人。亦不得令有所犯。到於兒前。惡氣觸兒。兒若得疾。必難救療也。

哺兒法

姚和衆云。小孩初生七日。助穀神以導達腸胃。研粟米煑粥飲。厚薄如乳。每日研與半粟殼。錢乙云。小兒多因愛惜過當。往往三兩歲猶未與飲食。致脾胃虛弱。平生多病。自半年以後。宜煎陳米稀粥。取粥面時時與之。十月以後。漸與稠粥、爛飯。以助中氣。自然易養少病。惟忌生冷、油膩、甜物之類。

浴兒法

千金論凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五臟疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以豬膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各三兩枝亦得咬咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以金虎湯浴金一斤虎頭骨一枚以水三斗煮爲湯浴但須浴卽煮用之

拭兒口法

千金論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此謂之玉衡若不急拭啼聲一發卽入腹成百病矣千金翼云成痞病死

聖惠論凡兒初飲乳後以髮纏指沾清水點拭了看齒根上有黃筋兩條便以葦刀子割斷點豬乳便差如兒口難開但先點豬乳自開

小兒集驗方云小兒初生每日以井華水或微溫水將潔靜舊軟帕子裹乳母手指蘸水撩拭小兒口中因而捺舌及兩頰令稍寬舒卽不生口噤積熱風疾等病京幾與山東人多能之謂之捺兒口拭畢仍用少研細入麝香乾坯子煙脂塗口中令兒美乳食

小兒集驗方云東平有一老嫗善與小兒拭口使不生鍊銀云小兒上下脣與齒斷相連處皆有一筋牽引若上脣筋緊卽生上煉下脣筋緊卽生下煉上煉生瘡滿頭或生眉間如有癬狀瘙痒不已時復流出

黃汁。汁至處又生瘡。若下煉則起腰、背。漸至四肢。亦如癬狀。亦瘙痒黃汁不已。若疾盛不治。或頭面上下相通。累年不效。又咬折或成大疾。惟是每日早晨取温水一盞。令其乳母以故軟潔靜帕子包手第二指。蘸温水拭兒口。水中渲下。又拭又捺。使兒口中淨。及捺上下筋令寬舒。卽小兒自美乳食。諸疾不生。亦永無煉銀。惟使筋寬舒。是法京畿見小兒失捺變爲口噤不喫妳。或不解捺而生煉銀者。不可勝數。

斷臍法

千金論曰。凡斷臍不得以刀子割之。須令人隔單衣物咬斷。兼以暖氣呵七遍。然後纏結所留臍帶。令至兒足趺上。短則中寒。令兒腹中不調。常下痢。若先斷臍然後浴者。則臍中水。臍中水則發腹痛。其臍斷訖。連臍帶中多有蟲。宜急剔撥去之。不爾入兒腹成疾。斷兒臍者。當令長陸寸。長則傷肌。短則傷藏。若不以時斷。及捺汁不盡。則令暖氣漸微。卽自生寒。令兒臍風。

嬰童寶鑑論小兒斷臍云。凡小兒生下。可先浴而後斷臍。及可以衣襯而口齧之。不然。則刀斷。如刀斷者。則以剪刀先於懷中厭令暖方用。又斷之則臍帶不可令長。只如子足長。短卽中寒而傷藏。長卽傷膚。先斷而後洗。卽令水入臍中。孩子多夭病。痛苦啼叫。面青黑爲中水患也。臍若短。卽腹中不調。常下痢。有中寒之患。其臍不可傷動。傷動卽令久不乾。如不乾卽傷外風。傷外風卽口噤。小兒不可救也。

祕要指迷論曰。嬰兒初生。剪去臍帶。切令剪刀煖。不可傷冷及外風所侵。

灸臍法

聖惠云。小兒生一宿。抱近明無風處。看臍上有赤脈直上者。當時於脈盡頭灸三壯。亦散無患矣。

裹臍法

千金論。凡裹臍法。椎治曰練令柔軟。方四寸。新綿厚半寸。與帛等合之。調其緩急。急則令兒吐哯。兒生二十日。乃解視臍。若十許日兒怒啼。似衣中有刺者。此或臍燥還刺其腹。當解之。易衣更裹。裹臍時閉戶、下帳、燃火。令帳中温暖。換衣亦然。仍以温粉粉之。此謂冬時寒也。若臍不愈。燒絳帛末粉之。若過一月。臍有汁不愈。燒蝦蟆灰粉之。日三四度。千金翼云。燒蝦蟆灰。治末粉臍中。又云。若臍未愈。乳兒太飽。令兒風臍也。若臍中水及中冷。則令兒腹絞痛。天糾啼呼。面目青黑。此是中水之過。當炙粉絮以熨之。不時治護。臍至腫者。當隨輕重。重者便灸之。乃可至八九十壯。輕者臍不大腫。但出汁時時啼呼者。擣當歸末和胡粉傅之。炙絮日熨之。至百日愈。以啼呼止爲候。若兒糞青者。冷也。與臍中水同。

甘草法

葛氏肘後方。小兒新產出。未可與朱蜜。取甘草如中指節。炙碎。以水二合。煮取一合。以纏綿點兒口中。可得一蜆殼止。兒當便吐胸中惡汁。此後待兒飢渴更與之。若兩服並不吐。盡一合止。若得吐惡汁。兒智惠無病。

黃連法

小兒集驗方云。凡小兒初生。必有惡汁留於胸次。若不消去。卽胸膈壅塞。易生蘊熱。驚癇瘡癤。皆由此也。

故小兒纔生。一臘之內。用好肥黃連數塊。槌碎。每少許厚。以綿包裹。如妳頭狀。湯內浸成黃汁。時復拈撫一二點。在小兒口內。卽惡汁自下。乳食便美。其後或間以朱蜜與之。若見惡汁已下。卽已有只用空綿包。別浸黃連釀苦汁與之者。

豬乳法

千金論曰。凡新生小兒。一月內常飲豬乳大佳。

聖惠法。凡取豬乳。須令豬兒飲母次。便提豬兒後脚起離乳。急捋之卽得。空捋無由得汁。

張渙論。嬰兒初生滿月內。常時時旋取豬乳滴口中。最爲佳矣。

藏衣法

外臺崔氏。凡藏兒衣法。兒衣先以淸水洗之。勿令沙土草汚。又以淸酒洗之。仍內錢一文。在衣中。盛於新瓶內。以靑帛裹其瓶口上。仍密蓋頭。且置便宜處。待滿三日。然後依月吉地。向陽高燥之處。入地三尺埋之。瓶上土厚一尺七寸。唯須牢築。令兒長壽有智惠。若藏衣不謹。爲豬狗所食者。令兒癲狂。蟲蟻食者。令兒病惡瘡。犬鳥食者。令兒兵死。近社廟傍者。令兒見鬼。近深水洿池。令兒溺死。近故竈傍。令兒驚惕。近井傍者。令兒病聾盲。弃道路街巷者。令兒絕嗣無子。當門戶者。令兒聲不出。耳聾。著水流下者。令兒靑盲。弃於火裏者。令兒生爛瘡。著林木頭者。令兒自絞死。如此之忌。皆須一謹之。

外臺崔氏又安產婦及藏衣天德月空法。

正月、天德在丁．月空在丙壬．
二月、天德在坤．月空在甲庚．
三月、天德在壬．月空在丙壬．
四月、天德在辛．月空在甲庚．
五月、天德在乾．月空在丙壬．
六月、天德在甲．月空在甲庚．
七月、天德在癸．月空在丙壬．
八月、天德在艮．月空在甲庚．
九月、天德在丙．月空在丙壬．
十月、天德在乙．月空在甲庚．
十一月、天德在巽．月空在丙壬．
十二月、天德在庚．月空在甲庚．

凡藏兒衣．皆依此法．天德、月空處埋之．若有遇反支者．宜以衣內新瓶盛．密封塞口．掛於宅外福德之上．向陽高燥之處．待過月然後依法埋藏之．大吉．

外臺崔氏又法．甲寅旬日．十日不得藏埋兒衣．以瓶盛密封．安置空處．度十日卽藏埋之．

外臺崔氏又法甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通掛著兒生處過此五日卽埋之亦不得更過此日

外臺崔氏又法甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊己日藏衣吉戊己日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生兒壬癸日藏衣吉

子母祕錄藏衣法先用一罐盛兒衣先以清水洗次以清酒洗次入大豆一合次小豆一合次城門土、市門土、獄門土、葱園中土、韭園中土各一合重重覆之上用五色帛各一尺五寸重重繫罐口上用鐵斧朱書云大豆某胡去無辜小豆歷歷去子癖城門土見公卿市門土足人行獄門土辟盜兵葱韭園土剪復生與兒青令兒壽命得長生與兒赤令兒身命皆清吉與兒白令兒壽祿皆千百與兒皂令兒長壽不衰老與兒黃令兒清淨去百殃急急如律令將此令於一尺二寸鐵葉上先用淨墨塗遍上以朱砂寫此語令在上置在罐口上且放便處待滿三日然後於月吉向陽高燥之處入地三尺埋之罐上令土厚一尺七寸唯須牢築使兒長壽有智慧

剃頭法

外臺崔氏初剃兒頭良日

寅丑日吉　丁未日凶

集驗方京畿初剃小兒頭不擇日皆於滿月日剃頭蓋風俗所尙前此產婦未得出房滿月卽與兒俱出

以謂胎髮穢惡。多觸神竈。小兒不安。故此日必剃頭而出。剃頭於溫煖避風處剃之。剃後須以生油、杏仁、膩粉頭上擦之。以辟風邪。其後小兒剃頭。亦宜用此。

禳謝法

外臺崔氏禳謝法。

軒轅者乾神。天丞相使者風伯。犯之令兒驚吐。可取梨枝六寸。埋生處。大吉。

雷公者震神。太陰使者天馬。犯之令兒煩悶腹滿。解之以三屠家肉爲餅。於產處謝之。大吉。

咸池者坎神。天之雨師使者。犯之令兒啼不止。用羊脯酒於生處謝之。

豐隆者艮神。天之東明使者。天僕也。害氣。犯之令兒乍寒乍熱。大腹。以白魚二枚於生處謝之。又大豆一升。投井中亦大吉。

招搖者坤神。天上使者。犯之令兒驚。空嚱不止。以酒餅生處謝之。卽愈。

天候者巽神。天一執法使者。犯之令兒腹脹、張服。以白魚二枚於生處謝之。吉。

吳時者離神。天一將軍遊擊使者。犯之令兒驚、腹痛。用馬脯五寸。於生處謝之。吉。又以白魚五枚。幷棗餅埋其生處。吉。

大時吉兌神。小時北斗使者。犯之令兒腹脹下痢。解之以酒脯。於生處謝之。又以大豆一升。投井中。吉。

犯月殺者。令兒驚啼。用丹雄雞血於生處謝之。吉。

犯白虎者.用稻米一升.雞子三枚.於生處謝之吉.黍米亦得.
犯大夫者.用羊肝三枚.及稻米一升.於生處謝之吉.又用雞、羝羊脾.黍米亦得.
犯日遊者.令兒口噤.色變欲死者.用三屠家肉麥飯.於生處謝之吉.

初生不作聲

千金論云.兒生落地不作聲者.取暖水一器灌之.須臾當啼.又云.兒生不作聲者.此由難產少氣故也.可取兒臍向身卻捋之.令氣入腹.仍呵之至百度.啼聲自發.亦可以葱白徐徐鞭之.卽啼.兒始生卽當舉之.遲晚則令中寒.腹內雷鳴.乃先浴之.然後斷臍.

初生不喫妳

巢氏病源.小兒難乳候.凡小兒初生.看產人見兒出.急以手料拭兒口.無令惡血得入兒口.則兒腹內調和.無有病疾.若料拭不及時.則惡血穢露.兒咽入腹.令心腹痞滿.短氣.兒不能飲乳.謂之難乳.又兒在胎之時.母取冷過度.冷氣入胞.令兒着冷.至兒生出.則喜腹痛.不肯飲乳.此則胎寒.亦名難乳也.

初生吐不止

錢乙論.初生下拭掠兒口中穢惡不盡.咽入喉中.故吐.凡初生急須拭掠口中令淨.若啼聲一發.則咽下多生諸病.

初生有緜癰病

千金論曰小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆簟盛水狀者名縣癰有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟米許大以刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有着舌下如此者名重舌有着頰裏及上齶如此者名重齶有着齒齗上者名重齗皆刺去血也

初生有重舌

巢氏病源小兒重舌候小兒重舌者心脾熱故也心候於舌而主於血脾之絡脈又出舌下心火脾土二藏母子也有熱卽血氣俱盛其狀附舌下近舌根生形如舌而短故謂之重舌

◉葛氏肘後治卒重舌方

用燒蛇蛻皮爲末唾和塗舌上卽差又用釜下土苦酒和塗舌上

初生着噤

巢氏病源小兒噤候小兒初生口裏忽結聚生於舌上如黍粟大令兒不能取乳名之曰噤此由在胎時熱入兒藏心氣偏受熱故也

長樂朱端章以所藏諸家產科經驗方編成八卷刻版南康郡齋淳熙甲辰歲十二月初十日

王雲五主編

叢書集成初編

種一他其及集慶寶育產

二冊

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者 陳敬衡 盧金聲 莊呂塵 鮑嘉祥）